



horticeres
sementes

catálogo
2020/2021



 horticteres[®]
sementes

ÍNDICE

8

Cucurbitáceas

8	Abóbora	10	Melancia
9	Abobrinha	11	Melão
10	Maxixe	11	Pepino

14

Folhosas

14	Agrião	18	Chicória	20	Rúcula
14	Alface	19	Coentro	21	Salsa
17	Almeirão	19	Espinafre		
18	Cebolinha	20	Mostarda		

24

Solanáceas

24	Berinjela	26	Pimentão
24	Jiló	26	Tomate
24	Pimenta		

30

Raízes e Bulbos

30	Beterraba
30	Cebola
31	Cenoura

34

Brássicas

34	Brócolis	35	Rabanete
34	Couve Chinesa	36	Repolho
34	Couve-de-folha		

38

Outras

38	Ervilha	39	Maracujá
38	Feijão-vagem	39	Quiabo
39	Grama		



Hortices: confiança de geração em geração

Fundada em 1967, a Hortices é uma das mais tradicionais marcas de sementes de hortaliças do Brasil. Independente e inovadora, atua não só no Brasil, mas em diversos países da América do Sul.

Sediada em Indaiatuba, SP, desde 2007, a Hortices é uma empresa 100% nacional e 100% sementeira. Trabalhamos as áreas de desenvolvimento, produção, beneficiamento, embalagem, marketing, vendas e logística para garantir que nossas melhores sementes cheguem até o produtor rural. Consolidada no mercado agrícola por nossa preocupação com a qualidade dos produtos oferecidos e pela busca constante por inovações, criamos um sistema de produção que se estende por diversos países. Tudo isso para garantir a disponibilidade de nossas sementes e assegurar elevados padrões de pureza e germinação.

Somos uma empresa nacional desde a fundação, com raízes em Igarapé, MG, e podemos falar com propriedade sobre produzir e desenvolver cultivares adaptadas aos nossos climas e solos. Pioneira no melhoramento de hortaliças no país, mantemos o compromisso com o agricultor de sempre buscar novidades que agreguem valor ao produtor rural e tragam mais vida às saladas. Com a incorporação do portfólio da Sementes Sakama, a Hortices oferece ao produtor e ao consumidor

novos produtos que atendam os diferentes paladares da culinária nacional e internacional.


Com uma visão diferenciada do negócio, acreditamos que fornecer o melhor para o produtor rural é levar mais qualidade de vida para o consumidor final, aliando produtividade e resistência a doenças. Por isso, realizamos constantes testes de campo buscando cultivares que mais agradam os consumidores, sempre ampliando o nosso portfólio para levar à mesa muito mais sabor.

Ciente da nossa responsabilidade social e pensando em levar uma melhor qualidade de vida às pessoas, a Hortices inovou com a campanha *Solidariedade: Semeie Esta Ideia* que possui participação integral de seus distribuidores e equipes. A campanha teve início em 2010 e em sete anos já doou mais de R\$ 200 mil, ajudando centenas de pessoas pelo país.

Com mais de 300 cultivares disponíveis em sete linhas de produtos, a Hortices orgulha-se em ser reconhecida por sua elevada qualidade e receber a confiança de gerações de produtores de todo o país.



Locais de Produção de Sementes



Visando manter o alto padrão da qualidade de suas sementes durante o ano todo, a HortiCeres selecionou estrategicamente áreas de produção ao redor do mundo.

Legendas de Ícones

Nas páginas a seguir, você encontrará, no descritivo dos produtos, ícones que representam as características da cultivar. Listamos ao lado o significado de cada ícone para melhor compreensão das informações.



Destaque do produto



Folha



Planta



Fruto



Época de plantio



Ciclo da cultivar



Raiz e bulbo



Cabeça



Florete



Cabeça



Vagem





Cucurbitáceas

8	Abóbora
9	Abobrinha
10	Maxixe
10	Melancia
11	Melão
11	Pepino



Abóbora Canhão Seca Gigante



Vigorosa com hábito de crescimento em rama.



De formato cilíndrico-alongado com pescoço. Peso médio entre 10 e 16 kg.



Uniformidade de frutos.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



120 a 150 dias.

Abóbora Goianinha



Vigorosa com hábito de crescimento em rama.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato cilíndrico com pescoço. Peso médio entre 400 g e 1 kg.



80 a 120 dias.



Abóbora Híb. Tetsukabuto Divina



Muito vigorosa com hábito de crescimento em rama e alto pegamento de frutos.



De formato redondo-achatado e coloração verde-escuro com polpa amarela intensa. Peso médio de 2 kg.



Uniformidade de frutos.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



80 a 120 dias.

Abóbora Jacarezinho



Rústica, de crescimento rasteiro.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato redondo-achatado e coloração verde com manchas creme. Peso médio entre 2 e 3 kg.



120 a 140 dias.



Abóbora tipo Maranhão



Vigorosa com hábito de crescimento em rama.



De formato variável, coloração externa creme-alaranjado e interna alaranjado intenso. Peso médio entre 5 e 8 kg.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



140 a 160 dias.

Abóbora Menina Brasileira



Excelente Padrão Comercial.



Vigorosa e produtiva com hábito de crescimento em rama.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato cilíndrico com pescoço. Peso médio entre 400 e 600 g.



75 a 90 dias.



Abóbora Mini Paulista



Vigorosa com hábito de crescimento rasteiro.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato oblongo, coloração verde-escuro e polpa alaranjada de sabor adocicado quando maduro.



120 a 150 dias.



Abóbora Moranga Exposição



Vigorosa com hábito de crescimento em rama.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato redondo-achatado, uniforme e coloração alaranjado. Peso médio entre 3 e 4 Kg.



90 a 120 dias.



Abóbora Nova Caravela



Vigorosa com hábito de crescimento em rama.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato oblongo e coloração branca. Peso médio entre 12 e 15 kg.



120 a 150 dias.



Abobrinha Caserta



Vigorosa com hábito de crescimento em moita.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato cilíndrico e coloração verde-claro, com listras.



40 a 50 dias.





Abobrinha Híb. Atlanta



Uniformidade.



Vigorosa com hábito de crescimento em moita.



De formato cilíndrico muito uniforme e coloração verde-claro com listras.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



40 a 50 dias.

Maxixe



Com hábito de crescimento rasteiro.




De formato globular-alongado, coloração verde-claro, comprimento entre 4 e 5 cm e cascas cobertas por acúleos. Peso médio entre 40 e 50 g.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



70 a 80 dias.



Maxixe Liso



Com hábito de crescimento rasteiro.



De formato globular-alongado, coloração verde-claro com comprimento entre 4 e 5 cm e casca lisa. Peso médio entre 40 e 50 g.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



70 a 80 dias.

Melancia Charleston Gray



Vigorosa com hábito de crescimento rasteiro.




De formato cilíndrico e coloração verde-claro. Polpa vermelha e macia.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



65 a 100 dias.



Melancia Crimson Sweet



Vigorosa com hábito de crescimento rasteiro.



De formato redondo-alongado e coloração verde-escuro com estrias verde-claras. Polpa vermelha, crocante, alto teor de açúcar e excelente sabor.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



65 a 100 dias.

Melancia Crimson Sweet Extra



Alta Produtividade.



Vigorosa com hábito de crescimento rasteiro e alto pegamento de frutos.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e alta luminosidade.



De formato redondo-alongado, grande e firme, de coloração verde-escuro e com estrias verde-claras. Polpa vermelha e crocante.



65 a 100 dias.



Melancia Fairfax



Vigorosa com hábito de crescimento rasteiro.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato cilíndrico-alongado e coloração verde-claro com listras verde-escuras. Polpa vermelha. Peso médio entre 12 e 15 kg.



65 a 85 dias.

Melancia Pérola



Vigorosa, produtiva e com alto pegamento de frutos.




Melhor adaptação em temperaturas quentes e alta luminosidade.



De formato redondo e coloração verde-claro. Polpa vermelha, macia e adocicada. Apresenta boa resistência ao transporte. Diâmetro entre 25 e 30 cm. Peso médio entre 10 e 12 kg.



65 a 85 dias.



Melão Redondo Gaúcho



Rústica com hábito de crescimento rasteiro.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De coloração alaranjado com sulcos longitudinais. Polpa laranja, crocante, com excelente sabor e alto teor de açúcar.



80 a 90 dias.

Pepino Híb. Caipira Guarani



Plantas Produtivas com Frutos de Alta Qualidade.



Vigorosa e uniforme, ramificada com hábito de florescimento ginóico.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



Tipo caipira, crocante e uniforme, de formato cilíndrico e coloração verde-claro degradê.



50 a 60 dias.





Pepino Híb. Kataná



Vigorosa com alta brotação lateral, monóica, com carga bem distribuída no ciclo e colheita estendida. Resistente a Míldio, Oídio e Mancha Alvo.



Tipo japonês, reto e uniforme, de formato cilíndrico e coloração verde-escuro brilhante, com espinhos brancos e comprimento entre 22 e 25 cm.



Qualidade de Frutos, Produtividade e Resistência a Doenças.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



50 a 60 dias.

Pepino Híb. Pickles Ginga



Vigorosa, com hábito de florescimento ginóico.



Tipo conserva, uniforme, de formato cilíndrico e coloração verde-escuro, com comprimento médio entre 6 e 10 cm e diâmetro médio entre 2 e 3 cm.





Plantas Muito Produtivas.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



40 a 50 dias.



Pepino Híb. Shogun



Vigorosa, com alta brotação lateral e hábito de florescimento monóico, com carga bem distribuída ao longo do ciclo e colheita estendida.



Tipo japonês, reto e uniforme, de formato cilíndrico e coloração verde-escuro brilhante, com espinhos brancos.



Resistência a Doenças (Míldio, Oídio e Mancha Alvo).



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



50 a 60 dias.

Pepino Híb. Ouro Verde



Vigorosa, com alta produtividade, média brotação lateral e hábito de crescimento ginóico (com frutos sequenciais). Tolerante a Míldio, Oídio, Mancha angular, WMV, ZYMV, CMV.



De coloração verde-escuro, casca lisa e brilhante. Comprimento médio entre 18 e 23 cm.



Resistência a Doenças.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



55 a 65 dias.



Folhosas

14	Agrião	19	Coentro
14	Alface	19	Espinafre
17	Almeirão	20	Mostarda
18	Cebolinha	20	Rúcula
18	Chicória	21	Salsa





Agrião D'água Folha Larga



Alta Produtividade.



Vigorosa com boa capacidade de perfilhamento e talos finos.



Melhor adaptação em temperaturas amenas e frias.



De coloração verde-escuro brilhante.



55 a 70 dias.

Agrião da Terra



Muito vigorosa e uniforme.



Melhor adaptação em temperaturas amenas e frias.



Arredondada e tenra, de coloração verde-escuro brilhante e sabor picante.



45 a 50 dias.



Agrião do Seco



Vigorosa e uniforme.



Melhor adaptação em temperaturas amenas e frias.



Arredondada e tenra, de coloração verde-claro e sabor picante.



45 a 50 dias.

Agrião Gigante da Serra Calixto



Folhas Grandes com Maços de Excelente Qualidade.



Vigorosa com boa capacidade de perfilhamento.



Ano todo.



Grande, de formato arredondado e coloração verde intenso brilhante.



55 a 70 dias.



Alface Florence



Excelente Apresentação Comercial e Resistência ao Pendoamento.



Volumosa e simétrica.



Ano todo.



Tipo mimosa, de folhas digitadas com coloração verde-médio brilhante.



55 a 70 dias.

Alface Gabi



Plantas Grandes e Resistência ao Pendoamento.



Grande e simétrica, com alto volume de folhas e alta tolerância ao pendoamento e "Tip Burn" (Queima de bordas).



Ano todo com destaque no verão.



Tipo mimosa, grande e de coloração verde-claro.



55 a 70 dias.



Alface Grand Rapids



Vigorosa.



Ano todo.



Crespa, larga de coloração verde-claro.



50 a 70 dias.



Alface Grandes Lagos



Bom fechamento de cabeça.



Melhor adaptação em temperaturas amenas e frias.



Tipo americana, espessa de coloração verde-escuro.



80 a 90 dias.



Alface Lia



Uniformidade.



Muito uniforme, compacta e alta tolerância ao pendoamento. Excelente para o cultivo hidropônico.



Ano todo.



Tipo mimosa ("bolinha"), grande e de coloração verde-claro.



70 a 80 dias.



Alface Liz



Uniforme, de coloração verde-médio.



Adaptada à diferentes regiões (temperaturas elevadas e inverno ameno).



Grande e grossa, uniforme com excelente formação de ombro.



50 a 70 dias.





Alface Luisa



Grande e simétrica, sem fechamento de cabeça, com excelente padrão comercial.



Lisa, de coloração verde-claro.



Resistência ao Pendoamento.



Ano todo.



55 a 70 dias.

Alface Marianne



Grande e simétrica.



Crespa, de coloração verde-médio e boa crespidade.



Plantas Grandes e Resistência ao Pendoamento.



Ano todo.



55 a 70 dias.



Alface Marisa



Grande e altamente tolerante ao calor.



Crespa de coloração verde-médio.



Resistência ao Pendoamento.



Ano todo com destaque em temperaturas quentes.



55 a 70 dias.

Alface Regina



Uniforme.



Lisa, de coloração verde-médio.



Ano todo.



55 a 70 dias.



Alface Rubia



Crespa roxa, de tamanho mediano, com alta uniformidade e tolerância ao pendoamento.



Crespa, de coloração roxo intenso brilhante.



Coloração e Brilho.



Ano todo.



70 a 80 dias.

Alface Salad Bowl



Grande e simétrica, com alto volume de folhas.



Ano todo.



Tipo mimosa, de coloração verde-claro.



55 a 70 dias.



Almeirão Catalonha



Vigorosa e uniforme com ótimo aspecto comercial.



Ano todo.



Repicada, de coloração verde-escuro.



60 a 70 dias.



Almeirão Folha Larga



Vigorosa e uniforme com ótimo aspecto comercial.



Ano todo.



Lanceolada, de coloração verde-escuro.



60 a 70 dias.



Almeirão Pão de Açúcar



Vigorosa e uniforme com fechamento de cabeça e ótimo aspecto comercial.



Ano todo.



Grande, de coloração verde-escuro.



60 a 70 dias.



Sementes Peletizadas.



Almeirão Spadona



Vigorosa e uniforme.



Ano todo.



Lanceolada, de coloração verde-médio.



60 a 70 dias.



Cebolinha de Folha Ibirité



Qualidade de Maços.



Vigorosa e uniforme com alta capacidade de perfilhamento.



Ereta, de coloração verde-claro e secção transversal arredondada.



Ano todo.



80 a 100 dias.

Cebolinha Todo Ano



Uniforme com bom desenvolvimento vegetativo.



Ano todo.



Ereta, de coloração verde e secção transversal arredondada.



80 a 100 dias.



Chicória Amazonas Gigante



Estabilidade de Desempenho.



Grande e de excelente aspecto comercial.



Grande, uniforme e larga, de coloração verde-médio.



Ano todo com destaque no verão.



70 a 90 dias.

Chicória Crespa



Grande com alta crespidade.



Melhor adaptação em épocas e regiões de clima ameno.



De coloração verde-escura na borda e miolo mais claro.



70 a 90 dias.



Chicória Malan



Uniformidade.



Grande, uniforme, com coração bem cheio e tolerante ao pendoamento.



Grossa, de coloração verde brilhante.



Ano todo.



70 a 90 dias.

Coentro Americano Gigante



Alta Produtividade.



Vigorosa, uniforme e tolerante ao pendoamento.



Ano todo. Evitar épocas e regiões de temperaturas muito frias.



Grande e lisa, de coloração verde-médio.



60 a 80 dias.



Coentro Aruba



Qualidade de Maços e Alta Produtividade.



Muito vigorosa e uniforme com excelente volume de maços. Tolerante ao pendoamento.



Melhor adaptação em temperaturas quentes.



Grande e lisa, de coloração verde-médio brilhante.



60 a 80 dias.



Coentro Verdão



Vigorosa, uniforme e rústica. Altamente produtiva.



Melhor adaptação em temperaturas quentes.



Lisa, de coloração verde-escuro brilhante, muito aromática.



45 a 65 dias.



Espinafre Híb. Popeye



Alta Produtividade.



Espinafre tipo verdadeiro, com planta vigorosa, ciclo precoce e boa tolerância ao frio.



Ano todo.



Grande e espessa, de formato lanceolado e coloração verde-escuro. Ótima conservação pós-colheita.



50 a 70 dias.



Espinafre Maori



Alta produtividade.



Vigorosa, ciclo precoce, com alto perfilhamento, resultando em aumento de produtividade. Tolerante a doenças de solo.



Ano todo.



Grande, de coloração verde-médio e formato periforme.



50 a 70 dias.





Espinafre Nova Zelândia



Sementes de Alta Qualidade.



Vigorosa, com alto potencial produtivo e boa adaptação a diversas condições de solo e clima.



Grande, de coloração verde-escuro e formato periforme.



Ano todo.



60 a 80 dias.

Mostarda Lisa



Vigorosa de porte ereto.



Melhor adaptação em temperaturas amenas e frias.



Oval com margens serrilhadas, espessa, de coloração verde brilhante e sabor levemente picante.



50 a 60 dias.



Rúcula Cultivada



Vigorosa, uniforme, de alta produtividade.



Comprida e recortada, de coloração verde-escuro e textura macia.



Ano todo.



40 a 50 dias.

Rúcula Folha Larga



Vigorosa, uniforme, de alta produtividade.



Ano todo.



Comprida e recortada, de coloração verde-escuro e textura macia.



40 a 50 dias.



Rúcula Selecta



Folhas Graúdas e Alta Produtividade.



Vigorosa e uniforme, de alta produtividade.



Larga e comprida, levemente recortada, de coloração verde-escuro. Comprimento médio entre 22 e 25 cm e largura média entre 6 e 7 cm.



Ano todo.



40 a 50 dias.

Salsa da Roça



Resistência a Doenças e Alta Produtividade.



Muito vigorosa, uniforme, alto volume de raízes e excelente brotação. Elevada tolerância a doenças de solo.



Evitar semeios de março a julho sob o risco de pendoamento.



Grande e recortada, de coloração verde-escuro brilhante, pecíolo com comprimento médio de 10 cm.



55 a 75 dias.



Salsa Graúda Portuguesa



Vigorosa com hábito de crescimento ereto. Resistente ao florescimento precoce e boa tolerância a baixas temperaturas.



Ano todo.



Grande e vigorosa, de coloração verde-escura e haste longa.



55 a 75 dias.



Salsa Lisa



Vigorosa com hábito de crescimento ereto, altamente aromática. Resistente ao pendoamento precoce.



Ano todo.



Grande e lisa, de coloração verde brilhante.



55 a 75 dias.





Solanáceas

24	Berinjela
24	Jiló
24	Pimenta
26	Pimentão
26	Tomate





Berinjela Embú



Rústica com ampla adaptação de cultivo.



De formato cilíndrico-bojudo e coloração roxo-escuro brilhante.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



100 a 120 dias.

Jiló Palmeira



Frutos Grandes.



Vigorosa, produtiva, bem ramificada.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato redondo e casca lisa, muito uniformes, de coloração verde-escuro brilhante e com diâmetro médio de 5 cm. Peso médio entre 50 e 60 g.



90 a 110 dias.



Jiló Português



Vigorosa, produtiva, bem ramificada.



Alongado, verde-claro brilhante, com peso médio de 90g



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



90 a 110 dias

Pimenta Biquinho



Muito uniforme, compacta, com altura média de 60 cm e alto pegamento de frutos.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato triangular pontiagudo, coloração vermelho brilhante, saboroso e crocante. Pungência ausente.



90 a 120 dias.



Pimenta Chapéu de Bispo



Uniforme e produtiva.



Com formato tipo sino, de coloração verde-claro e sabor adocicado.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



90 a 110 dias.

Pimenta de Cheiro



Vigorosa e uniforme com alto enfolhamento.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato tipo alongado e coloração amarelo-leitoso quando maduro, sem pungência.



90 a 120 dias.



Pimenta Dedo de Moça



Arbustiva com altura média entre 90 cm e 1,2 m.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De coloração vermelha quando maduro, comprimento médio entre 5 e 6 cm e elevada pungência.



90 a 120 dias.



Pimenta Leon



Alta Produtividade e Excelente Qualidade de Frutos.



Vigorosa e uniforme, com alta produtividade.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



Polpa espessa, coloração amarelo intenso quando maduro, diâmetro entre 2 e 2,5 cm e comprimento entre 10 e 12 cm. Pungência média.



100 a 140 dias.



Pimenta Malagueta



Vigorosa, de alta produtividade.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato filiforme, coloração vermelho quando maduro e comprimento médio entre 2 e 3 cm. Pungência média.



100 a 120 dias.



Pimenta Mexicali



Alta Produtividade e Excelente Qualidade de Frutos.



Vigorosa e uniforme, com alta produtividade.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



Polpa espessa, coloração vermelho intenso brilhante quando maduro, diâmetro entre 2 e 2,5 cm e comprimento entre 10 e 12 cm. Pungência média.



110 a 140 dias.



Pimentão All Big



Porte baixo e alta produtividade. Tolerante a Podridão do Colo e ToMV.



De formato quadrado, firme e de coloração verde/vermelho. Peso médio entre 200 e 250 g.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



100 a 120 dias.

Pimentão Cascadura Ikeda



De porte baixo e alta produtividade. Tolerante a PVY.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato cônico, coloração verde-escuro/vermelho e comprimento médio entre 10 e 12 cm. Peso médio entre 100 e 150 g.



100 a 120 dias.



Pimentão Híb. Paloma



Porte médio, bem enfolhada, uniforme, vigorosa e folhas verde-escuro. Resistente a PVY, BST 1-3: mancha bacteriana, TSWV e PeMV.



De formato retangular, uniforme, de coloração verde-escuro/vermelho, casca lisa, polpa espessa e comprimento entre 16 e 18 cm. Peso entre 250 e 300 g.



Excelente Qualidade de Frutos e Resistência a Doenças.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



100 a 120 dias.

Tomate Híb. Canarinho



Qualidade de Frutos e Excelente Pós-colheita.



Hábito de crescimento indeterminado, porte médio com alto enfolhamento e colheita estendida. Resistente a ToMV. Indicado para cultivo em estufa.



Melhor adaptação em temperaturas amenas.



Tipo grape, coloração amarelo-alaranjado brilhante, diâmetro de 2,5 cm, comprimento de 3,5 cm e excelente sabor (brix 6-9°). Excelente pós-colheita. Peso médio entre 18 e 23g.



100 a 120 dias.



Tomate Jumbo



Hábito de crescimento indeterminado. Resistente a Mancha de Estenfilio, Verticílio, Cancro bacteriano e ToMV.



Tipo santa cruz, firme, resistente a rachaduras e fundo preto. Peso médio de 150 g.



Melhor adaptação em temperaturas amenas.



100 a 120 dias.

Tomate Santa Clara



Hábito de crescimento indeterminado.
Tolerante a Murcha de Verticillium, PVY e
Murcha de Fusarium raça I.



Melhor adaptação em
temperaturas amenas.



Tipo santa cruz, firme, com boa coloração.
Peso médio de 180 g.



100 a 120 dias.







Raízes e Bulbos

30	Beterraba
30	Cebola
31	Cenoura



Beterraba Early Wonder Tall Top



De folhagem grande e ampla adaptação de cultivo.



De formato globular e coloração vermelho.



Melhor adaptação em temperaturas amenas e frias.



60 a 75 dias.

Beterraba Híb. Cabernet



Tolerância a Cercospora, Míldio e Oídio.



Vigorosa e uniforme, de folhas eretas. Suporta adensamento.



Ano todo com destaque no verão.



De formato arredondado, coloração interna e externa vermelho intenso, pequena inserção de folhas e sem presença de halos esbranquiçados.



60 a 75 dias.



Cebola Bola Precoce



Vigorosa e uniforme, folhas eretas e cerosas.



De formato globular e coloração amarela.



Melhor adaptação em temperaturas amenas e frias.



150 a 170 dias.

Cebola Crioula Imbuia



Ereta com folhas de alta cerosidade. Cebola do segmento "dias intermediários", tipo crioula.



Indicada para sementeiros de março a junho.



De formato arredondado, uniforme e casca grossa de coloração parda/vermelha.



180 a 200 dias.



Cebola IPA 11



Vigorosa, de coloração verde-azulada.



De formato globoso e coloração amarela.



Melhor adaptação em temperaturas quentes.



110 a 130 dias.

Cebola Super Precoce Veloster



Ciclo Super Precoce e Bulbos de Alta Qualidade.



Vigorosa e uniforme, com folhas eretas e cerosas, de coloração verde-azulada. Segmento "dias intermediários" e ciclo super precoce.



Indicada para semeios de março a junho.



De formato globular e casca de coloração amarelo dourado.



120 a 150 dias.



Cenoura Brasília



Com folhagem vigorosa de coloração verde-escuro. Tolerante ao pendoamento precoce.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato cilíndrico, coloração laranja-claro e coração mediano.



90 a 110 dias.

Cenoura Carandaí



Qualidade de Raízes.



Vigorosa, com altura média entre 40 e 50 cm e ciclo precoce. Tolerante a Alternaria e Cercospora.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De coloração externa e interna alaranjado intenso, coração pequeno, com pouca incidência de ombro verde. Comprimento médio entre 18 e 20 cm.



80 a 100 dias.



Cenoura Planalto



Rústica, com folhagem vigorosa, porte médio entre 25 e 30 cm. Tolerante ao Pendoamento precoce e resistente a queima das folhas e Nematóides.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De formato cilíndrico, lisas, de coloração alaranjada intensa, comprimento entre 18 e 22 cm, diâmetro entre 3 e 3,5 cm e ponta arredondada.




90 a 110 dias.





Brássicas

- 34 | Brócolis
- 34 | Couve Chinesa
- 34 | Couve-de-folha
- 35 | Rabanete
- 36 | Repolho



Brócolis Híb. Domador



Uniformidade de Cabeça.



Vigorosa e muito uniforme com folhas de arquitetura ereta.



Indicado para temperaturas amenas e frias.



De formato arredondado, compacta, de granulação fina. Peso médio entre 600 a 800 g.



90 a 110 dias.

Brócolis Ramoso Santana



Vigorosa e com boa ramificação permitindo colheitas múltiplas.



Melhor adaptação em temperaturas amenas e frias.



De coloração verde-azulado.



90 a 100 dias.



Brócolis Verão Ramoso Piracicaba



Vigorosa e com boa ramificação permitindo colheitas múltiplas.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De coloração verde-azulado.



70 a 100 dias.

Couve Chinesa Híb. Eikoo



Alta Tolerância a Certas Raças de Hérnia das Crucíferas, Erwinia, Vírus e Míldio.



Vigorosa, uniforme e de fácil cultivo.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas. *



De coloração externa verde-escuro e interna amarelo brilhante, de arquitetura média e base larga. Peso médio de 2,5 kg.



80 a 100 dias.



*Não recomendada para sementes de maio a julho sob risco de pendramento.

Couve-de-folha Híb. Manteiga HS 20



Alta Produtividade e Uniformidade de Folhas.



Com internódios curtos, bem adaptada a diversas condições de solo e clima. Baixa brotação lateral. Altura de planta média de 60 a 110 cm.



Ano todo.



Grande, redonda e macia, de coloração verde-médio, borda lisa e nervuras pouco salientes.



80 a 120 dias.



Couve-de-folha Manteiga Geórgia



Rústica, adaptada a diferentes condições de clima e solo.



Ano todo.



De coloração verde-escuro.



80 a 120 dias.



Couve-flor Piracicaba Precoce



Vigorosa, de porte médio, com boa tolerância ao calor.



Melhor adaptação em temperaturas quentes.



De coloração creme-claro e diâmetro médio entre 15 e 20 cm.



90 a 110 dias.



Couve-flor Teresópolis Gigante



Vigorosa, de porte grande. Possui boa resistência ao transporte.



Melhor adaptação em temperaturas frias e amenas.



De coloração branca, com diâmetro médio entre 25 e 30 cm.



120 a 140 dias.



Produtividade.



Melhor adaptação em temperaturas amenas e frias.



30 a 40 dias.



Rabanete Coral



Com boa quantidade de folhas, excelente para comercialização em maço. Tolerante a rachadura e isoporização.



De formato redondo, coloração externa vermelho intenso e polpa branca. Sabor agradável.




Qualidade e Alta Uniformidade de Raiz.



Ano todo.



30 a 40 dias.



Rabanete Híb. HS 2030 NS



Vigorosa e uniforme, com boa qualidade de folhas. Alta tolerância a isoporização e rachadura.




Ano todo.



De formato arredondado, coloração externa vermelho intenso e polpa branca, muito uniforme.



30 a 40 dias.





Repolho Chato de Quintal



De porte alto.



Compacta e de coloração verde-médio.



Melhor adaptação em temperaturas amenas e frias.



100 a 120 dias.

Repolho Coração de Boi



Vigorosa.



Melhor adaptação em temperaturas frias e amenas.



De formato cônico, coloração verde-médio e excelente sabor.



100 a 120 dias.



Repolho União



Vigorosa. Tolerante a Podridão Negra das Crucíferas.



De formato redondo, compacta e de coloração verde.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



100 a 120 dias.



Outras Culturas

- | | |
|----|--------------|
| 38 | Ervilha |
| 38 | Feijão-vagem |
| 39 | Gramma |
| 39 | Maracujá |
| 39 | Quiabo |



Ervilha Reta de Flor Roxa



Produtividade.



Muito produtiva com hábito de crescimento indeterminado.



De formato chato e de coloração verde-claro.



Melhor adaptação em temperaturas frias e amenas.



65 a 80 dias.

Feijão-vagem Grazi



Produtividade e Resistência a Doenças.



Vigorosa e produtiva, bem enfolhada, com hábito de crescimento indeterminado. Resistente a Antracnose, Ferrugem e BCMV.



Indicado para épocas e temperaturas quentes e amenas.



De formato cilíndrico, reta e uniforme, de coloração verde-claro, excelente qualidade e padrão de mercado, com pouca fibra e sem fio.



60 a 70 dias.



Feijão-vagem Macarrão Favorito



Rústica e altamente produtiva com hábito de crescimento indeterminado.



De formato cilíndrico-achatado, de coloração verde-claro.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



70 a 80 dias.

Feijão-vagem Macarrão Preferido



Vigorosa e altamente produtiva com hábito de crescimento indeterminado. Resistente a Ferrugem e Antracnose.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



Tipo macarrão, formato cilíndrico, de alta qualidade, coloração verde-claro, baixo teor de fibras e sem linha.



70 a 80 dias.



Feijão-vagem Mimoso Rasteiro



Vigorosa com hábito de crescimento determinado. Resistência a Ferrugem e Vírus do Feijoeiro (BCMV).



Tipo macarrão, de formato cilíndrico, reta, de coloração verde-claro, baixo teor de fibras e sem linhas.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



50 a 70 dias.

Grama Bermuda



Sementes Descascadas e Revestidas.



Vigorosa e de crescimento rápido.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



De coloração verde-intenso e com alta resistência ao pisoteio.



Perene.



Maracujá



Vigorosa com hábito de crescimento indeterminado.



Ideal para cultivo em temperaturas quentes e amenas.



De formato arredondado e coloração amarela. Peso médio de 200g.



4 a 9 meses.

Quiabo Santa Cruz 47



Cultivar Tradicional.



Vigorosa e uniforme de porte alto.



Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas.



Uniforme, de coloração verde-brilhante. Comprimento médio entre 12 e 18 cm.



60 a 90 dias.



Quiabo Speedy



Precocidade e Qualidade de Frutos.



Vigorosa e uniforme, de porte baixo, com internódios curtos, folha verde-escuro digitada, sem presença de espinho. Ciclo precoce.



Indicado para épocas e regiões de temperatura quente.



Uniforme, de coloração verde-médio brilhante, crocante, seção transversal levemente quinada e ausência de fibras. Comprimento médio entre 10 e 12 cm.



45 a 55 dias.

Plantio e Consumo de Sementes

As informações abaixo são indicativos gerais para o cultivo de hortaliças com o objetivo de auxiliá-lo no planejamento do plantio. A correta indicação para seu plantio deverá levar em conta a cultivar selecionada bem como as condições de solo e clima da região de plantio. Consulte sempre um agrônomo ou técnico.

Espécie/cultivar	Semeadura e plantio	Espaçamento (m)		Número estimado de plantas (1000)/ha	Número aproximado sementes/g	Consumo de sementes/ha
		Fileiras	Plantas ou covas			
Abóbora						
Nova Caravela/ Canhão	Direto	2,00-3,00	2,00	1,7/2,5	11	400-600 g
Goianinha	Direto	2,00-3,00	2,00	2,5	20	200-300 g
Jacarezinho	Direto	2,00-3,00	2,00	2,5	11	400-600 g
Menina Brasileira	Direto	2,00-2,50	1,00-1,50	2,5	11	300 g
Menina Clara	Direto	2,00-2,50	1,00	2,5	11	1,0-1,2 kg
Tetsukabuto	Direto	2,00-3,00	2,00	2,5	5	0,9-1,3 kg
Abobrinha	Direto	1,00-1,20	0,50-0,80	10,4-20,0	10	2,6-5,0 kg
Agrião D'água	Sementeira	0,20	0,20	250,0	5100	1,5-2,0 kg
Alface	Sementeira/Direto	0,20-0,30	0,20-0,30	89,0/200,0	950	190-430 g
Almeirão	Direto	0,15-0,20	0,05	800,0/1067,0	680	2,4-3,2 kg
Bardano	Direto	0,50	0,20-0,30	66,7/100,0	85	4,0-6,0 kg
Berinjela	Sementeira	1,20-1,50	0,50-0,60	11,1/16,6	230	100-150 g
Beterraba	Sementeira/Direto	0,25	0,08-0,10	320,0/400,0	67	7,0-9,0 kg
Brócolis	Sementeira	1,00	0,50	20,0	260	160 g
Cebola	Sementeira/Direto	0,25-0,30	0,10	267,0/320,0	310	1,8-2,1 kg
Couve-de-bruxelas	Sementeira	1,00	0,50	20,0	400	100 g
Cebolinha de Folha	Sementeira	0,20-0,25	0,20-0,25	160,0/200,0	450	730-900 g
Cenoura	Direto	0,15-0,20	0,04-0,05	800,0/1330,0	720	4,0-6,0 kg
Chicória	Sementeira	0,25	0,25	128,0	750	350 g
Coentro	Direto	0,20-0,30	0,10	267,0/400,0	78	5,0-7,0 kg
Couve Chinesa	Sementeira	0,80	0,30	42,0	340	250 g
Couve-de-folha	Sementeira	1,00	0,40-0,50	20,0/25,0	270	150-190 g
Couve-flor	Sementeira	1,00	0,50-0,60	17,0/20,0	380	90-110 g
Ervilha de Vagem	Direto	1,00	0,40-0,50	20,0/25,0	4	13,0-16,0 kg
Espinafre Verdadeiro	Direto	0,20-0,30	0,05	533,0/800,0	98	8,0-12,0 kg
Feijão-vagem Rasteiro	Direto	0,40-0,50	0,10	200,0/250,0	4	70,0-90,0 kg
Feijão-vagem Trepador	Direto	1,00	0,50	20,0	4	13,0 kg
Jiló	Sementeira	1,00-1,50	0,50-0,70	9,5/20,0	530	40-80 g
Melancia	Direto	2,00-3,00	1,50-2,00	2,5/3,3	11	600-800 g
Melão	Direto	2,00	1,00-1,50	3,3/5,0	26	300-500 g
Milho Verde	Direto	1,00	0,20	50,0	7	10,0 kg
Mogango	Direto	2,00	2,00	2,5	8	800 g
Moranga	Direto	2,00-3,00	2,00	1,7/2,5	6	0,7-1,0 kg
Mostarda	Direto	0,30	0,20	133,0	680	1,5-2,0 kg
Nabo	Direto	0,30-0,35	0,10-0,15	152,0/267,0	580	2,0-2,5 kg
Pepino	Direto	1,00-1,20	0,50-0,60	11,0/20,0	40	0,7-1,3 kg
Pimenta	Sementeira	1,20	0,60-0,80	10,4/13,9	320	70-90 g
Pimentão	Sementeira	1,00	0,30-0,40	25,0/33,3	170	300-400 g
Quiabo	Direto	1,00	0,20-0,30	33,0/50,0	17	6,0-9,0 kg
Rábano	Direto	0,40	0,20	125,0	80	2,5 kg
Rabanete	Direto	0,20	0,04-0,05	800,0/1000,0	110	10,0-13,0 kg
Repolho	Sementeira	0,80-1,00	0,30-0,40	25,0/42,0	280	180-300 g
Rúcula	Direto	0,20-0,30	0,05	533,0/800,0	650	1,2-1,8 kg
Salsa	Direto	0,20-0,30	0,10-0,15	178,0/400,0	550	4,0-4,5 kg
Tomate	Sementeira	0,80-1,20	0,40-0,80	16,6/31,0	340	100-190 g

Fonte: Adaptado do Manual ABCSEM - Campinas - 2015

Época de Plantio

Para um bom desenvolvimento, cada espécie de hortaliça exige condições diferenciadas de clima. As épocas de plantio apresentadas a seguir são de natureza geral e servem apenas como indicativo da época de cultivo ideal. Para a correta recomendação deve-se considerar aspectos de micro-clima regional e as características de cada cultivar. Consulte sempre um agrônomo ou técnico.

Época de plantio de acordo com o clima

Clima	Frio	Ameno	Quente
Abóbora	set a jan	ago a mar	ano todo
Abobrinha	set a fev	ago a mar	ano todo
Agrião D'água	ano todo	ano todo	mar a jul
Alface de Inverno	fev a out	fev a jul	mar a jul
Alface de Verão	ano todo	ano todo	ano todo
Almeirão	ano todo	ano todo	fev a ago
Bardano	ano todo	ano todo	abr a jun
Berinjela	set a jan	ago a mar	ano todo
Beterraba	ano todo	fev a ago	mar a jul
Brócolis de Inverno	fev a set	fev a jul	abr a jun
Brócolis de Verão	out a dez	set a jan	out a jan
Cebola Precoce	fev a abr	fev a abr	fev a abr
Cebola de Ciclo Normal	mar a mai	mar a mai	abr a mai
Cebolinha	ano todo	ano todo	fev a jul
Cenoura de Inverno	fev a ago	mar a jul	abr a jun
Cenoura de Verão	nov a jan	out a mar	ano todo
Chicória	ano todo	ano todo	fev a ago
Coentro	set a jan	ago a fev	ano todo
Couve-de-bruxelas	mar a jul	mar a jun	não plantar
Couve Chinesa	ano todo	ano todo	mar a jun
Couve-de-folha	ano todo	ano todo	mar a jun
Couve-flor de Inverno	fev a jun	fev a abr	não plantar
Couve-flor de Verão	dez a jan	out a fev	set a mar
Ervilha	fev a set	mar a jul	não plantar
Espinafre Verdadeiro	fev a out	mar a set	mar a mai
Feijão-vagem	set a fev	ago a mar	ano todo
Jiló	set a fev	ago a mar	ano todo
Melancia	out a fev	ago a mar	ano todo
Melão	não plantar	não plantar	fev a nov
Milho Verde	set a fev	ago a abr	ano todo
Mogango	set a jan	ago a mar	ano todo
Moranga	set a jan	ago a mar	ano todo
Mostarda	ano todo	ano todo	fev a jul
Pepino	out a fev	ago a mar	ano todo
Pimenta	set a fev	ago a mar	ano todo
Pimentão	set a fev	ago a mar	ano todo
Quiabo	out a fev	ago a mar	ano todo
Rabanete	ano todo	fev a set	abr a mai
Rábano	fev a jul	fev a jun	mai a jul
Repolho de Inverno	fev a set	fev a jul	abr a jun
Repolho de Verão	nov a jan	out a fev	ano todo
Repolho de Larga Adaptação	ano todo	ano todo	ano todo
Rúcula	ano todo	ano todo	mar a jul
Salsa	ano todo	ano todo	mar a set
Tomate	set a fev	ano todo	fev a ago

Germinação das Sementes

A germinação das sementes depende da temperatura e das condições químicas e físicas do solo. Além disso a presença de substâncias tóxicas no solo/substrato pode afetar ou inibir totalmente a germinação. O solo ou substrato serve de suporte as sementes e as raízes e afetam na disponibilidade e retenção de umidade e do oxigênio. Cada espécie possui exigências de umidade do solo/substrato, conforme tabela abaixo:

Exigências de umidade do solo

Umidade	Baixa	Média	Alta
Abóbora	Berinjela	Aipo	
Abobrinha	Cebola	Alface	
Brócolis	Cenoura	Beterraba	
Couve-flor	Ervilha		
Jiló	Espinafre		
Melancia	Fava		
Melão	Feijão-vagem		
Milho	Pepino		
Moranga	Tomate		
Nabo			
Pimenta			
Pimentão			
Rabanete			
Repolho			

A temperatura do solo/substrato influi decisivamente na germinação das sementes. Cada espécie possui exigências diferenciadas em relação a temperatura ideal para germinação conforme quadro abaixo:

Temperatura (°C) do solo ^(*)(**)

Temperatura	Mínima	Máxima	Ótima	Variação ótima
Abóbora, Abobrinha	16	38	35	21-35
Acelga	4	35	29	10-29
Aipo ou Salsão	4	29	21	16-21
Alface	2	29	24	4-27
Aspargo	10	35	24	16-29
Berinjela	16	35	29	24-32
Beterraba	4	35	29	10-29
Cebola	2	35	24	10-35
Cenoura	4	35	27	7-29
Couve-flor	4	38	27	7-29
Ervilha	4	29	24	4-24
Espinafre Verdadeiro	2	29	21	7-24
Fava	16	29	29	18-29
Feijão-vagem	16	35	27	16-29
Melancia	16	41	35	21-35
Melão	16	38	32	24-35
Milho	10	41	35	16-35
Moranga	16	38	32	21-32
Nabo	4	41	29	16-41
Pepino	16	41	35	16-35
Pimentão	16	35	29	18-35
Quiabo	16	41	35	21-35
Rabanete	4	35	29	7-32
Repolho	4	38	29	7-35
Salsa	4	32	24	10-29
Tomate	10	35	29	16-29

(*) Adaptado de Lorenz, O. A. e Maynard, D. N. Knott's Handbook for Vegetable Growers. Third Edition. 1988. 456p. (**) Dentro dos limites de temperatura exigidos pela espécie, sempre que a temperatura for mais baixa, a germinação será mais lenta e desuniforme.

Notas

O desempenho de cultivares de hortaliças depende de sua carga genética e também da interação entre vários fatores do ambiente tais como: temperatura, umidade, solo, adubação, presença ou não de doenças e pragas, etc.

Isto significa que, sob determinadas situações, o comportamento ou as características da planta (frutos, raízes, bulbos e folhas) podem sofrer variações relativamente grandes.

Portanto, considere que as informações apresentadas nesse Catálogo representam sempre condições ideais para o desenvolvimento e desempenho de cada cultivar.

Em situações que não correspondam às condições ideais de ambiente ou tecnologia de cultivo consulte sempre seu agrônomo ou então os distribuidores, revendedores e técnicos da Hortiteres.

Outro aspecto importante para acompanhar este Catálogo, diz respeito aos termos usados para classificar a reação de cultivares às doenças. Aplicam-se as definições universalmente convencionadas:

Imunidade

É capacidade que a planta tem de estar isenta de uma determinada doença. Essa característica não se aplica a nenhum produto descrito neste catálogo.

Resistência

É a capacidade que a planta tem de impedir a infecção ou o desenvolvimento de certa doença. Esta capacidade pode variar de intensidade de acordo com as condições da planta, do clima e da doença. Seja qual for esse grau, a cultivar portadora de genes para resistência conduz a um nível de doença sempre menor do que aquele existente em uma cultivar suscetível.

Tolerância

É a capacidade que a planta possui de suportar uma determinada doença, com danos de produção inferiores a materiais suscetíveis.

Suscetibilidade

Característica de não apresentar resistência ou dificuldades ao ataque de doenças ou condições adversas.


Tabela de Doenças

Nome Comum/Abreviação	Nome Científico/Nome Completo
Míldio do Pepino	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>
Oídio do Pepino	<i>Sphaerotheca fuliginea</i>
Mancha Angular	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachymans</i>
Mancha Alvo do Pepino	<i>Corynespora casicola</i>
PVY	Vírus do Mosaico da Batata (Potato virus Y)
Mancha Bacteriana do Pimentão	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>
TSWV	Vira-Cabeça (Tomato spotted wilt virus)
PeMV	Pepper mottle virus
ToMV	Vírus do Mosaico do Tomateiro (Tomato mosaic virus)
TMV	Vírus do Mosaico do Tabaco (Tobacco mosaic virus)
Mancha de Estenfilio do Tomate	<i>Stemphyllium solani</i>
Murcha-Verticilar do Tomate	<i>Verticillium dahliae</i>
Cancro Bacteriano	<i>Clavibacter michiganensis</i>
Hérnia das crucíferas	<i>Plasmodiophora brassicae</i>
Erwinia	<i>Erwinia carotovora</i>
Míldio das Crucíferas	<i>Peronospora parasitica</i>
Queima das Folhas	<i>Alternaria dauci</i>
Nematóides (NM)	<i>Meloidogyne</i> spp.
Antracnose	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>
Podridão-de-fomopsis	<i>Phomopsis vexans</i>
Podridão do colo	<i>Phytophthora capsici</i>
Cercospora	<i>Cercospora</i> sp.
Míldio da Beterraba	<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>betae</i>
Oídio da Beterraba	<i>Erisiphe betae</i>
Cercospora da Cenoura	<i>Cercospora carotae</i>
Ferrugem do Feijão-Vagem	<i>Uromyces appendiculatus</i>
BCMV	Vírus do Mosaico Comum do Feijoeiro (Bean common mosaic virus)
Podridão Negra das Crucíferas	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>
Murcha de Fusarium	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i>
Vírus do Mosaico da Melancia	WMV (Watermelon mosaic virus)
Vírus do Mosaico Amarelo da Abobrinha	ZYMV (Zucchini yellow mosaic virus)
Vírus Mosaico do Pepino	CMV (Cucumber mosaic virus)
Vírus da Mancha Anelar do Mamoeiro	PRSV-W (Papaya ringspot virus - Watermelon Strain)
Sarna do Pepino	<i>Cladosporium cucumerinum</i>

Nossos Distribuidores

Uma rede de distribuição, com técnicos e agrônomos para recomendar o produto Horticeres que atenda às suas necessidade é um dos nossos pontos fortes. São empresas especializadas na distribuição de sementes de hortaliças com experiência e tradição no mercado.

Assegurar que os produtores de todo o Brasil tenham acesso aos nossos produtos: este é o desafio da Horticeres.



AGRÍCOLA CERES
(62) 3292-2110
agricolaceres@agricolaceres.com.br
www.agricolaceres.com.br

AGROUNIDOS
(65) 3625-1000
agrounidos@brturbo.com.br

BOASAFRA
(69) 3422-2323
boasafra@boasafraagro.com.br
www.boasafraagro.com.br

CASA BUGRE
(19) 3894-3141
vendas@casabugre.com.br
www.casabugre.com.br

CASA BUGRE RIO
(21) 3642-1738
vendas@casabugrerio.com.br
www.casabugre.com.br

ECOSEED
(77) 3420-1260
ecoseed@hotmail.com

MULT MINAS
(35) 3265-2226
germina@cpagricola.com.br

PROPLANTA
(81) 3272-2615
proplanta@proplanta.net
www.proplanta.net

TECSEED
(41) 3266-0131
tecseed@tecseed.com.br
www.tecseed.com.br

XP DISTRIBUIÇÃO
(54) 3029-9009 / 0800 6069990
televendas1@xpdistribuicao.com.br

Bolívia

AGRO CAMPO
+591-3-3368354
agro_campo@entelnet.bo

Paraguai

Nutrivet
+595-61-570.491
recepcion@nutrivet.com.py



Horticeres Sementes Ltda.
Av. Presidente Vargas - 2921 - sl 1210 - Sky Towers Office
Indaiatuba/SP - Fone: (19) 3835-1420

