



**SEMENTES QUE VALORIZAM A VIDA**

**CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025**



**Fornecer a melhor semente para o produtor rural é levar mais qualidade de vida para o consumidor final.**

Por isso, pesquisamos, desenvolvemos e produzimos sementes adaptadas às nossas condições de cultivo e realizamos constantes testes de campo buscando cultivares que tragam mais rentabilidade para o produtor e valorizem os consumidores, levando à mesa muito mais sabor e diversidade.

## **A melhor opção em sementes de hortaliças.**

A Horticeres Sementes é uma empresa 100% brasileira com atuação global. Nossas sementes são produzidas em diversos países, buscando sempre elevada qualidade genética, física, patológica e fisiológica para proporcionar a mais alta performance no campo. Fundada em 1967, nossa marca é sinônimo de tradição, qualidade e inovação em sementes de hortaliças.

 **horticeres**<sup>®</sup>  
sementes

# Índice

|    |                                         |    |                                  |
|----|-----------------------------------------|----|----------------------------------|
| 5  | Abóbora Híb. <b>Kanda</b>               | 39 | Couve-flor Híb. <b>Vick</b>      |
| 6  | Agrião <b>Ônix</b>                      | 40 | Couve-de-folha Híb. <b>HS 20</b> |
| 7  | Alface <b>Ariel</b>                     | 41 | Couve-manteiga Híb. <b>HS 30</b> |
| 8  | Alface <b>Cris</b>                      | 42 | Espinafre Híb. <b>Popeye</b>     |
| 9  | Alface <b>Fabi</b>                      | 43 | Espinafre <b>Nova Zelândia</b>   |
| 10 | Alface <b>Liz</b>                       | 44 | Espinafre <b>Maori</b>           |
| 11 | Alface <b>Alice</b>                     | 45 | Feijão-vagem <b>Brutus</b>       |
| 12 | Alface <b>Betty</b>                     | 46 | Feijão-vagem <b>Gisele</b>       |
| 13 | Alface <b>Gabi</b>                      | 47 | Feijão-vagem <b>Grazi</b>        |
| 14 | Alface <b>Florence</b>                  | 48 | Pepino Híb. <b>Kataná</b>        |
| 15 | Alface <b>Rosanna</b>                   | 49 | Pepino Híb. <b>Odissey</b>       |
| 16 | Alho-porro <b>Atal</b>                  | 50 | Pepino Híb. <b>HS 1020</b>       |
| 17 | Almeirão <b>Pão de Açúcar</b>           | 51 | Melão Híb. <b>Canarinho</b>      |
| 18 | Berinjela Híb. <b>Roxelle</b>           | 52 | Melão Híb. <b>Estrela</b>        |
| 19 | Beterraba Híb. <b>Cabernet</b>          | 53 | Pimenta <b>Mexicali</b>          |
| 20 | Cebola Híb. <b>Poliana</b>              | 54 | Pimentão Híb. <b>Heloísa</b>     |
| 21 | Cebola Híb. <b>Raiza</b>                | 55 | Pimentão Híb. <b>Isabela</b>     |
| 22 | Brócolis Híb. <b>Akemi</b>              | 56 | Rabanete Híb. <b>HS 2030 NS</b>  |
| 23 | Cebolinha Híb. <b>Nagoya</b>            | 57 | Salsa da <b>Roça</b>             |
| 24 | Cebolinha Folha <b>Ibirité</b>          | 58 | Quiabo Híb. <b>Majestade</b>     |
| 25 | Cebolinha <b>Midoriakawa</b>            | 59 | Quiabo <b>Speedy</b>             |
| 26 | Cebolinha <b>Sappore</b>                | 60 | Repolho Híb. <b>Murasaki</b>     |
| 27 | Cebolinha <b>Tokyo Kuro</b>             | 61 | Repolho Híb. <b>Soberano</b>     |
| 28 | Cenoura <b>Sertão</b>                   | 62 | Rúcula <b>Selecta</b>            |
| 29 | Cenoura Híb. <b>Andressa</b>            | 63 | Rúcula <b>Thunder</b>            |
| 30 | Chicória <b>Amazonas Gigante</b>        | 64 | Tomate Híb. <b>Red Sugar</b>     |
| 31 | Chicória <b>Malan</b>                   | 65 | Tomate Híb. <b>Dante</b>         |
| 32 | Chicória <b>Melissa</b>                 | 66 | Tomate Híb. <b>Vero</b>          |
| 33 | Chicória <b>Radicchio di Fiorentino</b> | 67 | Tomate Híb. <b>F3ra</b>          |
| 34 | Coentro <b>Aruba</b>                    | 68 | Tomate Híb. <b>Runner</b>        |
| 35 | Coentro <b>Verdão</b>                   | 69 | Tomate Híb. <b>Cordel</b>        |
| 36 | Couve-chinesa Híb. <b>Eikoo</b>         | 70 | Tomate Híb. <b>Vitalino</b>      |
| 37 | Couve-chinesa Híb. <b>Hodan</b>         | 72 | <b>Demais produtos</b>           |
| 38 | Couve-flor Híb. <b>Fuji</b>             |    |                                  |

Abóbora Híb.

## Kanda



Abóbora híbrida japonesa (tipo Tetsukabuto) de planta vigorosa, frutos uniformes, polpa espessa e de alta produtividade. Apresenta excelente pós-colheita.

 Destaque

Produtividade e uniformidade.

 Fruto

Frutos de formato globular, levemente gomados, uniformes, coloração verde escura, brilhante, polpa espessa apresentando peso médio de 2,2 a 2,8 kg.

 Planta

Plantas vigorosas, uniformes, com hábito de crescimento rasteiro e excelente emissão de brotos laterais. Ciclo entre 85 a 110 dias.

 Época de plantio

Ano todo em regiões de clima quente e em épocas quentes para regiões de clima ameno.



Agrião de planta uniforme, raízes vigorosas e tolerante ao pendoamento precoce. Mercado hidropônico.



Alta produtividade e bom rendimento de maço.

Destaque



Folhas largas e eretas, de formato arredondado, com pecíolo longo e coloração verde intenso.

Folhas



Planta vigorosa, uniforme e de alta produtividade. Ciclo entre 50 a 55 dias.

Planta



Ano todo.

Época de plantio



Alface tipo crespa de plantas grandes, uniformes e de excelente padrão comercial. Apresenta alta tolerância ao pendoamento. Indicada para o cultivo protegido, campo aberto e hidropônico.



Plantas grandes e excelente aspecto comercial.

Destaque



Folhas largas, simétricas e de coloração verde intenso e brilhantes.

Folhas



Plantas grandes, uniformes e alto volume de folhas. Ciclo entre 60 a 65 dias.

Planta



Ano todo com destaque no verão.

Época de plantio

# Alface Cris



Alface do tipo crespa de plantas grandes, com folhas largas e simétricas de excelente aspecto comercial. Apresenta resistência ao pendoamento, tip burn e às 25 principais raças de Míldio\* que ocorrem no Brasil.

Resistência ao Míldio e aspecto comercial.



Destaque

Folhas largas, simétricas, com alta crespidade e coloração verde intenso.



Folhas

Plantas grandes e volumosas, apresentando estabilidade e excelente aspecto comercial. Ciclo entre 60 a 65 dias.



Planta

25 principais raças de Míldio (BI)\* que ocorrem no Brasil.



Resistência

\*BI - *Bremia lactucae*

# Alface Fabi



Alface tipo crespa de plantas grandes, precoces, rústicas e tolerantes ao pendoamento precoce e tip burn e às principais raças de Míldio\* que ocorrem no Brasil.

Plantas grandes e precoces.



Destaque

Folhas grandes, compridas e crespas, de coloração verde médio brilhante.



Folhas

Plantas grandes, rústicas, adaptadas ao cultivo adensado, talos grossos, boa sanidade e tolerantes ao pendoamento precoce. Ciclo entre 60 a 65 dias.



Planta

As principais raças de Míldio (BI)\* que ocorrem no Brasil.



Resistência

\*BI - *Bremia lactucae*

Alface  
**Liz**



Alface tipo lisa de plantas grandes, uniformes, com folhas brilhantes. Excelente padrão comercial e boa sanidade.



Destaque

Plantas grandes e sem fechamento de cabeça.



Folhas

Folhas lisas, coloração verde claro, brilhante. Sem fechamento de cabeça.



Planta

Plantas grandes e uniformes. Excelente padrão comercial e resistentes ao pendoamento precoce. Ciclo entre 55 a 60 dias.



Época de plantio

Ano todo.

Alface  
**Alice**



Alface do tipo americana, de plantas grandes, uniformes, folhas largas e grossas. Produz alfaces de cabeças graúdas e compactas, com excelente coloração e brilho.



Destaque

Plantas grandes e uniformes.



Folhas

Folhas largas e grossas que conferem boa proteção à cabeça.



Planta

Plantas grandes, uniformes, com alto volume de folhas e boa tolerância a doenças foliares. Ciclo entre 80 a 90 dias.



Época de plantio

Primavera e verão.

# Alface Betty



Alface do tipo americana, de plantas grandes e uniformes, folhas largas e grossas. Apresenta excelente desempenho para cultivos em épocas e regiões de temperaturas elevadas, com destaque para a resistência de campo.

Cultivo em altas temperaturas e uniformidade.



Destaque

Largas e grossas, conferindo boa proteção à cabeça. Excelente coloração e brilho.



Folhas

Plantas grandes, uniformes, com alto volume de folhas, tolerantes ao pendoamento precoce. Ciclo entre 80 a 90 dias.



Planta

Cultivo de verão.



Época de plantio

# Alface Gabi



Alface do tipo mimosa, de plantas grandes, simétricas e uniformes com alta resistência ao pendoamento precoce, tip burn, LMV e as principais raças de Míldio que ocorrem no Brasil.

Tamanho e resistência ao pendoamento precoce.



Destaque

Folhas tipo mimosa, grandes e de coloração verde-claro.



Folhas

Plantas grandes e simétricas, uniformes e com alto volume de folhas. Ciclo entre 50 a 60 dias.



Planta

Míldio (BI) e LMV.



Resistência

BI – *Bremia lactucae* | LMV – *Lettuce mosaic virus*

Alface

# Florence



Alface do tipo mimosa de plantas volumosas, tolerantes ao pendoamento precoce e de excelente aspecto comercial.

Plantas volumosas.



Destaque

Folhas tipo mimosa com coloração verde médio brilhante e repicadas.



Folhas

Plantas vigorosas, volumosas, tolerantes ao pendoamento precoce e excelente aspecto comercial. Ciclo entre 50 a 60 dias.



Planta

Ano todo com destaque no verão.



Época de plantio

Alface

# Rosanna



Alface tipo crespa de plantas grandes e volumosas, com folhas de coloração roxo intenso. Tolerante ao pendoamento precoce.

Tamanho e coloração.



Destaque

Folhas grandes, crespas e de coloração roxo intenso brilhante.



Folhas

Plantas grandes, volumosas, com boa formação de base. Tolerante ao pendoamento precoce. Ciclo entre 50 a 60 dias.



Planta

Ano todo.



Época de plantio

Alho-porro

# Atal



Alho-porro de planta com formação ereta, talos longos, grossos, boa durabilidade pós-colheita e alto rendimento. Referência de mercado.

Alto rendimento e padrão comercial.



Destaque

Talos de coloração branca, longos, grossos, com média de 20 a 25 cm de comprimento. Boa durabilidade pós-colheita e excelente rendimento.



Talo

Planta de formação ereta, com folhas de coloração verde claro. Ciclo entre 110 a 140 dias.



Planta

Ano todo.



Época de cultivo

Almeirão

# Pão de Açúcar



Seleção de plantas vigorosas de elevada uniformidade visando a formação de mais de 90% de cabeças. Sementes produzidas especialmente para peletização. Praticidade na sementeira, aliada a alta taxa de germinação e vigor.

Cabeça de qualidade e uniformidade.



Destaque

Folhas grandes e de coloração verde médio brilhante.



Folhas

Planta vigorosa, volumosa, uniforme com ótimo fechamento de cabeça. Excelente aspecto comercial. Ciclo entre 60 a 70 dias.



Planta

Ano todo para clima ameno e outono/inverno para regiões de clima quente.




Época de plantio

SEMENTES QUE VALORIZAM A VIDA



Berinjela Híb.

# Roxelle



Berinjela híbrida de planta vigorosa, com alta produtividade e frutos de excelente padrão comercial. Apresenta resistência elevada a Cg.

Qualidade de frutos.



Destaque

Frutos de formato padrão, com comprimento médio de 20 - 22 cm e peso médio de 250 a 270 g, coloração intensa, brilhante e excelente aspecto comercial.



Frutos

Planta vigorosa, com boa arquitetura, fácil condução, bom pegamento de frutos e alta produtividade. Ciclo médio de 110 dias.



Planta

Resistência intermediária à Cg.




Resistência

Cg – *Colletotrichum gloeosporioides*

Beterraba Híb.

# Cabernet



Beterraba híbrida de plantas vigorosas, uniformes, raiz arredondada de alta produtividade e resistência a doenças.

Alta produtividade e resistência a doenças.



Destaque

Raiz de formato arredondado, com coloração interna e externa vermelho intenso. Pequena inserção de folhas e sem presença de halos esbranquiçados.



Raiz

Plantas vigorosas, uniformes, folhas eretas, comprimento entre 30 e 35 cm. Ciclo entre 70 a 80 dias.



Planta

Pfb, Cb e Eb.




Resistência

Pfb – *Peronospora farinosa* f. sp. *betae* | Cb – *Cercospora beticola* | Eb – *Erysiphe betae* (oídio)

Cebola Híb.

# Poliana



Híbrido de dia curto, com planta vigorosa, bulbos arredondados, de coloração amarelo-claro e elevado potencial produtivo. Apresenta resistência à Pt.

Qualidade e produtividade.

Destaque

Bulbos arredondados de coloração amarelo-claro com “pescoço” fino.

Bulbo

Planta vigorosa, porte ereto, alto potencial produtivo. Ciclo entre 110 a 130 dias.

Planta


Pt.

Resistência

Pt – *Pyrenochaeta terrestris*

Cebola Híb.

# Raiza



Híbrido de dia curto, com planta vigorosa e folhagem verde escura com boa cerosidade. Produz bulbos arredondados e uniformes de coloração amarela, com alta produtividade e resistência à raiz rosada (*Pyrenochaeta terrestris*).

Alta produtividade e excelente sistema radicular.

Destaque

Bulbos arredondados, uniformes e de coloração amarela.

Bulbo

Planta com folhagem vigorosa, boa cerosidade e coloração verde escura. Ciclo entre 125 e 130 dias.

Planta

Pt.

Resistência

Pt – *Pyrenochaeta terrestris*

Brócolis Híb.

# Akemi



Brócolis híbrido do tipo ramoso, de plantas vigorosas, com alta brotação lateral, granulometria média e excelente pós-colheita.

Qualidade de maços e produtividade.



Destaque

Cabeças uniformes, com floretes longos de granulometria média, excelente pós-colheita e qualidade de maços.



Cabeça

Plantas vigorosas, uniformes e alta brotação. Ciclo entre 90 a 110 dias.



Planta

Indicado para cultivo em temperaturas amenas e frias.



Época de cultivo

Cebolinha Híb.

# Nagoya



Cebolinha híbrida de planta vigorosa, com folhas de coloração verde escuro. Apresenta facilidade de toalete.

Alto vigor e coloração intensa.



Destaque

Folhas de coloração verde escuro com baixa incidência de queima de pontas e quebra de folhas.



Folhas

Planta vigorosa, com boa sanidade e facilidade de toalete. Ciclo entre 60 a 70 dias.



Planta

Ano todo.



Época de cultivo

Cebolinha

# Folha Ibirité



Cebolinha de planta vigorosa, uniforme, porte ereto e alta capacidade de perfilhamento. Apresenta resistência à Pt (Raiz Rosada).

Qualidade de maços.



Destaque

Folhas eretas, de coloração verde-claro e secção transversal arredondada.



Folhas

Planta vigorosa e uniforme, com boa capacidade de perfilhamento e boa conservação pós-colheita. Ciclo entre 80 a 90 dias.



Planta

Raiz Rosada (Pt).



Resistência

Pt – *Pyrenochaeta terrestris*

Cebolinha

# Midoriakawa



Cebolinha fina de plantas vigorosas, com alto perfilhamento, folhas de parede espessa, excelente resistência a doenças foliares e sanidade. Apresenta ótima pós-colheita e aspecto comercial.

Alta sanidade e resistência a doenças foliares.



Destaque

Folhas de coloração verde escura brilhante, parede espessa e boa resistência a doenças foliares. Pouca ocorrência de folhas amarelas, reduzindo o tempo de preparo dos maços.



Folhas

Plantas vigorosas, porte ereto e bom perfilhamento. Apresenta boa resistência à quebra das folhas e alta performance sob condições de elevada amplitude térmica. Ciclo entre 60 a 80 dias.



Planta

Ano todo.



Época de cultivo

Cebolinha

# Sappore



Cebolinha de planta vigorosa, com alta sanidade, folhas finas e muito produtivas. Apresenta boa tolerância a doenças foliares.

Alta produtividade e ótimo pós-colheita.

Folhas finas, de coloração verde azulada. Permite até 5 cortes sem engrossar as folhas.

Plantas vigorosas, produtivas e de ótimo pós-colheita. Ciclo entre 60 a 80 dias.

Ano todo.

Cebolinha

# Tokyo Kuro



Cebolinha de planta vigorosa, porte ereto, bom perfilamento, com folhas de parede espessa e alto rendimento. Possui elevada performance sob condições de alta amplitude térmica.

Alta performance.


Folhas de coloração verde escura brilhante, boa resistência a doenças foliares, parede espessa e com boa conservação pós-colheita, obtendo altos rendimentos de maços.

Planta muito vigorosa, porte ereto, bom perfilamento, podendo ser colhida como folhas finas ou médias. Ciclo entre 70 a 90 dias.

Ano todo.

Cenoura

# Sertão



Cenoura de plantas rústicas, raízes lisas, cilíndricas e ponta arredondada. Adaptação em temperaturas quentes e amenas. Apresenta resistência elevada à Ad, Cc e intermediária à N (Mi, Ma, Mj), Xhc.

 **Destaque** Cultivo de verão e resistência a doenças.

 **Raízes** Raízes lisas, de coloração alaranjado intenso, formato cilíndrico, comprimento médio entre 18 e 22 cm, diâmetro médio entre 3 cm e 3,5 cm e ponta arredondada.


 **Planta** Plantas rústicas, com folhagem vigorosa, porte médio de 25 - 30 cm. Tolerante ao pendoamento precoce. Ciclo entre 85 a 100 dias.

 **Resistência** Ad, Cc, N e Xhc.

Ad – *Alternaria dauci* | Cc – *Cercospora carotae* | Xhc – *Xanthomonas hortorum* pv. *carotae*  
N (Ma, Mi, Mj) – *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*

Cenoura Híb.

# Andressa



Híbrido de verão, precoce, com raízes de excelente produtividade, coloração, pele e brilho. Apresenta resistência elevada à Ad, Cc e intermediária à Xhc.

 **Destaque** Elevada produtividade e precocidade.

 **Raízes** Raízes de formato cilíndrico com excelente comprimento, coloração (alaranjado intenso), pele e brilho. Coração pequeno, ponta arredondada e ótimo fechamento de ombro e ponta.

 **Planta** Planta vigorosa, ereta e com bom enfolhamento. Ciclo entre 90 a 100 dias.

 **Resistência** Ad; Cc e Xhc.

Ad – *Alternaria dauci* | Cc – *Cercospora carotae* | Xhc – *Xanthomonas hortorum* pv. *carotae*

Chicória

# Amazonas Gigante



Chicória de plantas grandes e vigorosas, folhas uniformes, largas e excelente aspecto comercial.

Plantas grandes e rusticidade.



Destaque

Folhas grandes, uniformes, largas e de coloração verde médio.



Folhas

Plantas vigorosas e uniformes com folhas basais grandes e largas. Ciclo entre 70 a 90 dias.



Planta

Ano todo com destaque no verão.



Época de cultivo

Chicória

# Malan



Chicória de plantas grandes, uniformes, com folhas grossas e crocantes. Tolerantes ao pendoamento precoce e excelente aspecto comercial.

Uniformidade e coração cheio.



Destaque

Folhas grossas, crocantes, coloração verde brilhante.



Folhas

Plantas grandes, uniformes, rústicas e com coração bem cheio. Apresenta tolerância ao pendoamento e excelente aspecto comercial. Ciclo entre 70 a 90 dias.



Planta

Ano todo.



Época de cultivo

Chicória

# Melissa



Chicória do tipo lisa, de plantas vigorosas, pesadas, folhas grandes, sem recortes e ondulações. Possui boa sanidade e excelente padrão comercial.

Resistente ao pendoamento precoce.

Destaque

Folhas grandes, de coloração verde médio, sem recortes e sem ondulações.

Folhas

Plantas vigorosas, rústicas, pesadas, com bom enchimento, boa formação de base e estabilidade. Ciclo entre 70 a 90 dias.

Planta

Ano todo.

Época de cultivo

Radicchio

# Di Fiorentino



Chicória Radiccio de plantas com boa formação, uniformidade, cabeças graúdas e tolerantes ao pendoamento precoce. Indicadas para épocas de clima ameno.

Cabeças graúdas e uniformes.

Destaque

Cabeça compacta, graúda, de formato arredondado, coloração vermelho intenso brilhante e nervuras brancas.

Cabeça

Planta uniforme, com boa formação de base, compacidade e tolerância ao pendoamento precoce.

Planta

Indicadas para temperaturas e épocas amenas.

Época de cultivo

Coentro

# Aruba



Coentro de planta vigorosa, uniforme e volumosa, com folhas largas, talos grossos e excelente padrão comercial. Em hidroponia, apresenta poucas quantidades de folhas amareladas, reduzindo a necessidade de toalete. Apresenta bom enraizamento e tolerância ao pendoamento.

Excelente sanidade e qualidade de maços.

★ Destaque

Folhas largas, grandes, lisas, de coloração verde escuro brilhante.

🌿 Folhas

Plantas muito vigorosas, uniformes, com excelente volume de maços e talos grossos. Tolerantes ao pendoamento. Ciclo de 50 a 60 dias.

🌱 Planta

Ano todo com destaque em temperaturas quentes, evitar épocas e regiões muito frias.

🌞 Época de cultivo

Coentro

# Verdão



Coentro de plantas vigorosas, rústicas, de folhas lisas e aromáticas. Sementes revestidas por filmcoating, garantindo eficiência e proteção do agricultor e meio ambiente.

Qualidade e tratamento de sementes (filmcoating).

★ Destaque

Folhas lisas, de coloração verde escuro brilhante e muito aromáticas.

🌿 Folhas

Plantas vigorosa, uniformes, rústicas e altamente produtiva. Ciclo entre 40 a 50 dias.

🌱 Planta

Melhor adaptação em temperaturas quentes com excelente adaptação às regiões Norte e Nordeste.

🌞 Época de cultivo

Couve-chinesa Híb.

# Eikoo



Couve chinesa de planta vigorosa, uniforme, cabeça compacta, excelente sanidade foliar. Apresenta resistência elevada à Pb.

☆

Destaque

Excelente qualidade de cabeças.

🌿

Cabeça

Cabeças compactas, compactas, de coloração externa verde escura e interna amarela brilhante.

🌱

Planta

Planta vigorosa, uniformes, com alta sanidade. Ciclo médio de 80 dias.

🛡️

Resistência

Pb.

Pb - *Plasmodiophora brassicae*

Couve-chinesa Híb.

# Hodan



Couve de planta vigorosa, com folhas eretas, cabeça compacta, excelente sanidade foliar e destaque para o cultivo em altas temperaturas. Apresenta resistência elevada à Pb e Abe e intermediária à TuMV e CaMV.

☆

Destaque

Excelente sanidade e qualidade de plantas.

🌿

Cabeça

Cabeças compactas, de formato bala de canhão e miolo amarelado.

🌱

Planta

Planta vigorosa, com folhas eretas, alta sanidade e ciclo médio de 80 dias.

🛡️

Resistência

Pb, Abe, TuMV e CaMV.

Resistência elevada: Pb - *Plasmodiophora brassicae* | Abe - *Alternaria brassicae*  
Resistência intermediária: TuMV - *Turnip mosaic virus* | CaMV - *Cauliflower mosaic virus*

Couve-flor Híb.

# Fuji



Couve-flor híbrida de plantas muito vigorosas, uniformes e produtivas. Apresenta boa sanidade foliar, tolerância às variações climáticas e excelente durabilidade pós-colheita.

Sanidade e estabilidade.

Destaque

Cabeças grandes e compactas, de coloração branca, com excelente aspecto comercial e durabilidade pós-colheita.

Cabeça

Plantas vigorosas, uniformes, produtivas, com folhas grandes, apresentando boa sanidade foliar e tolerância às variações climáticas. Ciclo entre 100 a 105 dias.

Planta

Cultivo de inverno.

Época de cultivo

Couve-flor Híb.

# Vick



Couve-flor híbrida de planta vigorosa, uniforme, cabeças de excelente aspecto comercial. Indicada para cultivos de verão. Apresenta resistência intermediária à Xcc.

Alta produtividade e estabilidade.

Destaque

Cabeça grande, compacta, uniforme, coloração branca, com excelente qualidade e aspecto comercial.

Cabeça

Plantas vigorosas e uniformes com folhas grandes que proporcionam excelente proteção de cabeças. Ciclo de 90 a 100 dias.

Planta

Xcc.

Resistência

Xcc – *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*

Couve-de-folha Híb.

HS 20



Couve híbrida de alta produtividade e uniformidade de folhas.  
Excelente performance de campo.

☆

Alta produtividade e uniformidade de folhas.

Destaque

🌿

Folhas grandes e redondas, de coloração verde médio, bordos lisos e nervuras pouco salientes.

Folhas

🌱

Plantas uniformes, compactas, internódios curtos e tolerantes à diversas condições de solo e clima. Pouca brotação lateral e altura média de 60 a 110 cm. Ciclo entre 70 a 80 dias.

Planta

🌞

Ano todo.

Época de cultivo

Couve-manteiga Híb.

HS 30



Couve-manteiga híbrida de alta produtividade, rendimento e uniformidade de folhas do início ao final do ciclo.

☆

Alto rendimento e padronização de folhas.

Destaque

🌿

Folhas grandes, levementes onduladas de coloração verde-médio, pecíolo preenchido e nervuras finas.

Folhas

🌱

Plantas de tamanho uniforme, internódios curtos, média brotação lateral, altura média de planta de 60 a 110 cm. Ciclo médio de 65 a 75 dias.

Planta

🌞

Ano todo.

Época de cultivo

Espinafre Híb.

# Popeye



Espinafre híbrido verdadeiro de plantas vigorosas, ciclo precoce, boa tolerância a frio, folhas grandes e espessas. Apresenta ótima pós-colheita e tolerância a Pfb.

Alta produtividade e ótima conservação pós-colheita.

★ Destaque

Folhas grandes e espessas, de formato lanceolado e coloração verde escuro.

🌿 Folhas

Espinafre verdadeiro com plantas vigorosas, ciclo precoce, boa tolerância ao frio e ótima conservação pós-colheita. Ciclo entre 50 a 60 dias.

🌱 Planta

Pfb.

🛡️ Resistência

Pfb – *Peronospora farinosa* f. sp. *betae*

Espinafre

# Nova Zelândia



Espinafre com boa adaptação à diversas condições de solo e clima, folhas grandes e alto potencial produtivo.

Elevada taxa de germinação e alto vigor.

★ Destaque

Folhas grandes e de coloração verde escura.

🌿 Folhas

Plantas vigorosas com alto potencial produtivo e boa adaptação a diversas condições climáticas. Ciclo entre 60 a 90 dias.

🌱 Planta

Ano todo.

🌞 Época de cultivo

## Espinafre Maori



Espinafre de plantas vigorosas, ciclo precoce, alto perfilhamento e folhas grandes. Tolerantes a doenças de solo.

Ciclo precoce e elevada tolerância a doenças.



Destaque

Folhas grandes, de formato periforme e coloração verde médio.



Folhas

Plantas vigorosas, de ciclo precoce, com elevada produtividade devido ao alto perfilhamento. Ciclo entre 50 a 70 dias.




Planta

Ano todo.



Época de cultivo

## Feijão-vagem Brutus



Feijão-vagem de crescimento determinado, com vagens cilíndricas de alta produtividade. Apresenta resistência elevada à CI e intermediária à BCMV, Psp raça 6.

Alta produtividade e estabilidade.



Destaque

Vagens cilíndricas, lisas e retas, de coloração verde escura brilhante.



Vagem

Plantas vigorosas com hábito de crescimento determinado, porte ereto, evitando o contato das vagens com o solo. Ciclo entre 60 a 70 dias.



Planta

CI, BCMV e Psp.




Resistência

CI - *Colletotrichum lindemuthianum* | BCMV - Bean common mosaic virus  
Psp - *Pseudomonas savastanoi* pv. *phaseolicola* raça 6

Feijão-vagem

# Gisele



Feijão-vagem de crescimento indeterminado, vagens com produção sequencial, boa sanidade e longevidade de colheita. Excelente sabor e ausência de fibras. Apresenta resistência intermediária à BCMV.



Vagem com excelente qualidade e coloração verde intensa.

Destaque



Vagens de excelente qualidade, boa sanidade, formato cilíndrico (comprimento médio de 15 cm) e coloração verde escura.

Vagem



Plantas vigorosas, com hábito de crescimento indeterminado, bom pegamento de flor, produção sequencial e muito produtiva. Ciclo entre 80 a 90 dias.

Planta




BCMV.

Resistência

BCMV – Bean common mosaic virus

Feijão-vagem

# Grazi



Feijão-vagem de crescimento indeterminado, com vagens retas, uniformes e lisas. Apresenta excelente padrão de mercado e resistência elevada a CI, Ua e intermediária BCMV.



Produtividade e resistência a doenças.

Destaque



Vagens retas, uniformes, formato cilíndrico, coloração verde-clara e com pouca fibra. Apresenta excelente qualidade e padrão de mercado.

Vagem



Plantas vigorosas, com hábito de crescimento indeterminado, muito produtivas e bem enfolhadas. Ciclo entre 80 a 90 dias.

Planta



CI, Ua e BCMV.

Resistência

CI – Colletotrichum lindemuthianum | Ua – Uromyces appendiculatus | BCMV – Bean common mosaic virus

Pepino Híb.

# Kataná



Pepino híbrido tipo japonês, de frutos retos, uniformes e com alta produtividade. Apresenta resistência à Ccu, Co, Pcu, Px e intermediária à CMV, WMV, ZYMV.



Alta produtividade e resistência a doenças.

Destaque



Frutos tipo japonês, retos, uniformes e de coloração verde escuro brilhante. Apresenta espinhos brancos, formato cilíndrico e comprimento médio entre 22 e 25 cm.

Fruto



Planta vigorosa com brotação lateral, monóico, com carga bem distribuída no ciclo e colheita estendida. Ciclo entre 50 a 60 dias.

Planta



Ccu, Co, Pcu, Px, CMV, WMV e ZYMV.

Resistência

Ccu – Cladosporium cucumerinum | Co – Colletotrichum orbiculare | Px – Podosphaera xanthii | Pcu – Pseudoperonospora cubensis  
CMV – Cucumber mosaic virus | WMV – Watermelon mosaic virus | ZYMV – Zucchini yellow mosaic virus

Pepino Híb.

# Odissey



Pepino híbrido do tipo caipira, de planta vigorosa, uniforme, com excelente sanidade e padrão comercial. Indicado para consumo fresco ou conserva. Apresenta resistência elevada à Co, Px e intermediária à Ccu, CMV, PRSV, ZYMV, WM.



Alto pegamento, rendimento e padronização de frutos.

Destaque



Frutos tipo caipira, uniformes, de coloração verde-escuro, com excelente padrão comercial.

Fruto



Plantas vigorosas, monoicas, com excelente sanidade e alto pegamento sequencial de frutos. Ciclo médio de 50 dias.

Planta




Co, Px, Ccu, CMV, PRSV, ZYMV, WMV.

Resistência

Co – Colletotrichum orbiculare | Px – Podosphaera xanthii | Ccu – Cladosporium cucumerinum | CMV – Cucumber mosaic virus  
PRSV – Papaya ringspot virus | ZYMV – Zucchini yellow mosaic virus | WMV – Watermelon mosaic virus

Pepino Híb.

# HS 1020



Pepino híbrido de hábito indeterminado, planta vigorosa, frutos de coloração verde escuro (aodai), retos, produtivos e excelente padrão. Apresenta resistência elevada à Px, Co, Ccu e intermediária CMV, ZYMV, PRSV, Psl, Pcu, Cca.

Produtividade e excelente padrão comercial.



Destaque

Frutos de coloração verde escuro (aodai), brilhantes, retos, de casca lisa com espinhos pouco salientes. Apresenta comprimento médio entre 20 - 25 cm e diâmetro médio entre 6 - 7 cm.



Fruto

Plantas de crescimento indeterminado, ginoicas, vigorosas, com alta brotação lateral e pegamento sequencial de frutos. Ciclo entre 40 a 60 dias.



Planta

Ccu, Co, Px, Cca, CMV, Pcu, PRSV, Psl, ZYMV.




Resistência

Ccu – *Cladosporium cucumerinum* | Co – *Colletotrichum orbiculare* | Px – *Podosphaera xanthii* | Cca – *Corynespora cassiicola*  
CMV – *Cucumber mosaic virus* | Pcu – *Pseudoperonospora cubensis* | PRSV – *Papaya ringspot virus*  
Psl – *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* | ZYMV – *Zucchini yellow mosaic virus*

Melão Híb.

# Canarinho



Planta vigorosa e produtiva com frutos grandes pesando de 3 a 4 kg, casca de cor amarela-intensa, forma elíptica, excelente sabor, alto brix e polpa firme.

Produtividade e padrão de mercado.



Destaque

Grandes, com média de 3 a 4 kg, cor da casca amarela-intensa, polpa firme, alto brix e excelente sabor.



Fruto

Vigorosa, tolerante a doenças e alta frutificação (média de 1,5 frutos por planta).



Planta

Maio a novembro.




Época de cultivo

# SEMENTES QUE VALORIZAM A VIDA

Melão Híb.

# Estrela



Melão de plantas rústicas, com hábito de crescimento rasteiro, frutos de coloração alaranjada com sulcos longitudinais, polpa crocante e excelente sabor.

Sanidade de planta e excelente sabor.



Destaque

Fruto de coloração amarelo ouro, com bom calibre, pós-colheita e excelente brix. Peso de 1,8 a 2,4 kg.



Fruto

Planta vigorosa, com boa adaptação e com excelente cobertura foliar. Ciclo de 68 a 72 dias.



Planta


Primavera e verão.



Época de cultivo

Pimenta

# Mexicali



Pimenta de planta vigorosa, uniforme com frutos grandes, de polpa espessa e média pungência.

Alta produtividade e excelente qualidade de frutos.



Destaque

Frutos grandes, uniformes, de tamanho médio entre 10 e 12 cm, diâmetro médio entre 2 e 2,5 cm, com coloração vermelho brilhante, polpa espessa e pungência média.



Frutos

Plantas vigorosas, rústicas e uniformes. Ciclo entre 110 a 130 dias.



Planta


Primavera e verão.



Época de cultivo

Pimentão Híb.

# Heloísa



Pimentão híbrido de plantas vigorosas, uniformes, com pegamento sequencial de frutos e alto potencial produtivo. Ótimo padrão comercial.

Alta produtividade e ótimo padrão comercial.

Destaque

Frutos do tipo lamuyo, coloração verde escuro, casca lisa, parede espessa, de peso entre 250-300 g e comprimento médio entre 16-18 cm. Apresentam ótimo padrão comercial.

Frutos

Plantas vigorosas, uniformes e muito produtivas. Porte médio, com alto enfolhamento e folhas verde-escuro. Ciclo entre 100 a 110 dias.

Planta


PVY 1,2 e ToMV.

Resistência

PVY 1,2 – Potato Y virus | ToMV – Tomato mosaic virus

Pimentão Híb.

# Isabela



Pimentão de plantas vigorosas, porte alto, frutos de formato cônico, casca lisa e polpa espessa. Apresenta resistência elevada à Pc e Pp, e intermediária à PVY e ToMV.

Resistência à *Phytophthora*.

Destaque

Frutos de formato cônico, casca lisa, polpa espessa, peso entre 200 e 220 g, comprimento médio de 14 a 16 cm, diâmetro de 6 a 8 cm e coloração verde intenso.

Frutos

Planta vigorosa, uniforme, de porte alto e bem enfolhada. Ciclo entre 100 a 110 dias.

Planta

Pc, Pp, PVY e ToMV.

Resistência

Pc – *Phytophthora capsici* | Pp – *Phytophthora porri* | PVY – Potato Y virus raças 1 e 2 | ToMV – Tomato mosaic virus

Rabanete Híb.

# HS 2030



Rabanete híbrido, de planta vigorosa, muito uniformes e tolerantes à rachadura e isoporização.

 Destaque

Raízes uniformes e tolerantes à rachadura e isoporização.

 Raízes

Raízes de formato arredondado, excelente uniformidade e coloração vermelha intensa.

 Planta

Planta de porte médio, com boa quantidade de folhas, ideal para comercialização em maços. Ciclo entre 25 a 35 dias.

 Época de cultivo

Ano todo.

Salsa

# da Roça



Salsa do tipo lisa de planta vigorosa, uniforme, produtiva, folíolos grandes e com ótima sanidade. Excelente desenvolvimento no verão.

 Destaque

Sanidade e alta produtividade.

 Folhas

Folhas de coloração verde escuro brilhante, folíolos grandes e recortados, pecíolo com comprimento médio de 10 cm, apresentando baixa incidência de folhas pequenas na base (reduz descarte).

 Planta

Plantas do tipo lisa, muito vigorosas, uniformes e com ótima brotação. Alto volume de raízes. Ciclo entre 55 a 75 dias.

 Época de cultivo

Ano todo, com destaque para verão. Atenção para semeaduras entre março a junho, pois há risco de pendoamento.

Quiabo Híb.

# Majestade



Planta de crescimento indeterminado, vigorosa, com boa brotação lateral, excelente sanidade foliar, alta produtividade e precocidade.

Produtividade e precocidade.

Destaque

Frutos verde claros, de formato cilíndrico, sem espinhos e boa durabilidade pós-colheita. Peso médio de 8 a 10 g.

Frutos

Planta de crescimento indeterminado, vigorosa, produtiva, com excelente brotação lateral e sanidade. Ciclo entre 60 a 80 dias.

Planta

Primavera e verão.

Época de cultivo

Quiabo

# Speedy



Quiabo de planta vigorosa, com menor presença de espinhos e frutos uniformes. Apresenta maior facilidade de colheita e precocidade.

Precocidade e qualidade de frutos.

Destaque

Frutos uniformes, de coloração verde médio brilhante, crocantes e ausência de fibras. Apresentam comprimento médio entre 10 - 20 cm.

Frutos

Plantas vigorosas, uniformes, de porte baixo, com internódios curtos. Folhas verde escuro digitadas, sem presença de espinhos. Ciclo entre 45 a 55 dias.

Planta

Indicados para épocas e regiões de temperaturas quentes.

Época de cultivo

Repolho Híb.

# Murasaki



Repolho híbrido de planta vigorosa, formato rendondo e levemente achatado, excelente coloração e alta uniformidade. Apresenta resistência intermediária à Xcc.

Alta tolerância a doenças foliares.



Destaque

Cabeça arredondada e levemente achatada, de coloração roxa intensa e miolo compacto.



Cabeça

Planta vigorosa, com boa cobertura foliar.



Planta

Xcc.



Resistência

Xcc – *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*

Repolho Híb.

# Soberano



Repolho híbrido verde de planta vigorosa, cabeça grande, compacta e uniforme. Apresenta resistência elevada à Foc e intermediária à Xcc.

Uniformidade e sanidade.



Destaque

Grande, compacta, pesada e de formato semi-achatado. Apresenta coração pequeno.



Cabeça

Planta vigorosa, com boa cobertura foliar e alta sanidade. Folhas de coloração verde-escuras e cerosas. Ciclo entre 90 a 100 dias.



Planta

Foc e Xcc.



Resistência

Foc – *Fusarium oxysporum* f. sp. *conglutinans* | Xcc – *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*

Rúcula

# Selecta



Rúcula de planta vigorosa, uniforme, com folhas largas, compridas e levemente recortadas. Ideal para o cultivo hidropônico, em estufas e campo.

Destaque

Folhas grandes e alta produtividade.

Folhas

Folhas largas, levemente recortadas, de coloração verde escuro, comprimento médio entre 22 – 25 cm e largura 6 – 7 cm.

Planta

Plantas vigorosas, uniformes, de alta produtividade que resultam em maços de excelente aspecto comercial.  
Ciclo entre 40 a 45 dias.

Época de cultivo

Ano todo.

Rúcula

# Thunder



Rúcula de planta vigorosa, uniforme, com folhas largas, compridas e levemente recortadas. Ideal para o cultivo hidropônico e convencional.

Destaque

Precocidade e sanidade.

Folhas

Folhas largas, compridas, levemente recortadas, de coloração verde escuro.

Planta

Plantas vigorosas, uniformes, com alta produtividade e maços de excelente aspecto comercial.  
Ciclo entre 30 a 40 dias.

Época de cultivo

Ano todo.

Tomate Híb.

# Red Sugar



Tomate híbrido tipo grape de hábito de crescimento indeterminado, planta vigorosa, com boa sanidade, frutos de formato grape, com polpa espessa e excelente aspecto comercial. Apresenta resistência elevada Fol O,1, Va, Vd e intermediária N (Mi), ToMV.

Alta produtividade e uniformidade.



Destaque

Frutos de formato grape, simétricos, com excelente aspecto comercial, peso médio de 20 - 25 g, polpa espessa e coloração vermelho intenso brilhante.



Frutos

Planta vigorosa, com hábito de crescimento indeterminado, boa proteção foliar e boa sanidade. Ciclo entre 100 a 120 dias.



Planta

Fol O,1 (raças 1 e 2), Va, Vd, N (Mi) e ToMVd.




Resistência

Fol O,1 – *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* raças 1 e 2 | Va – *Verticillium albo-atrum* | Vd – *Verticillium dahliae*  
N (Mi) – *Meloidogyne incognita* | ToMV – *Tomato mosaic virus*

Tomate Híb.

# Dante



Tomate de plantas vigorosas, frutos graúdos, excelente firmeza, com ótima qualidade e sabor. Possui resistência elevada à Va, Vd, Fol O,1, Ss e resistência intermediária à N (Ma, Mi, Mj), TMV, TSWV e TYLCV.

Ótima qualidade de frutos e excelente pacote de resistência a doenças.



Destaque

Frutos graúdos, uniformes, firmes, de formato saladete, com ótima qualidade, coloração, brilho e sabor.



Frutos

Plantas vigorosas com excelente cobertura foliar, de hábito de crescimento indeterminado. Ciclo entre 100 a 110 dias.



Planta

Va; Vd; Fol O,1; N; Ss; N (Ma, Mi, Mj); TMV, TSWV e TYLCV.




Resistência

Va – *Verticillium albo-atrum* | Vd – *Verticillium dahliae* | Fol O,1 – *Fusarium oxysporum* f.sp. *lycopersici* raças 1 e 2  
Ss – *Stemphylium solani* | N (Ma, Mi, Mj) – *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*  
TMV – *Tobacco mosaic virus* | TSWV – *Tomato spotted wilt virus* | TYLCV – *Tomato yellow leaf curl virus*

# SEMENTES QUE VALORIZAM A VIDA

Tomate Híb.

# Vero



Tomate de plantas vigorosas, com alta produtividade, frutos alongados, firmes e excelente sabor. Apresenta resistência elevada à Fol 0,1 e 0,2, Va, ToMV e intermediária à N (Mi), TSWV, TYLCV.

Sabor e qualidade de frutos.

Frutos do tipo italiano, formato alongado, firmes, coloração vermelho intenso e excelente sabor.

Plantas vigorosas, com alta produtividade e hábito de crescimento indeterminado. Ciclo entre 90 a 110 dias.

Fol 0,1 e 0,2; Va; ToMV; N (Mi); TSWV e TYLCV.

Fol 0,1 e 0,2 – *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* raças 1, 2, 3 | Va – *Verticillium albo-atrum* | ToMV – Tomato mosaic virus  
N (Mi) – *Meloidogyne incognita* | TSWV – Tomato spotted wilt virus | TYLCV – Tomato yellow leaf curl virus

Tomate Híb.

# F3ra



Tomate tipo salada, de hábito indeterminado, com plantas vigorosas, que apresentam boa sanidade de folhas nas chuvas e frutos grandes, de excelente firmeza e tolerância a rachaduras nas chuvas. Possui resistência elevada à Va, Vd, Fol 0,2 e resistência intermediária à N (Ma, Mi, Mj), TMV, TSWV, TYLCV.

Resistência a *Fusarium* raça 3 e sanidade na chuva.

Frutos do tipo salada, grandes, uniformes, excelente firmeza e tolerantes a rachaduras no período chuvoso.


Plantas vigorosas e equilibradas, com boa cobertura foliar, sanidade e hábito de crescimento indeterminado. Ciclo entre 100 a 110 dias.

Va; Vd; Fol 0,2; N; TMV; TSWV e TYLCV.

Va – *Verticillium albo-atrum* | Vd – *Verticillium dahliae* | Fol 0,2 – *Fusarium oxysporum* f.sp. *lycopersici* raça 3  
N (Ma,Mi,Mj) – *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*  
TMV – Tobacco mosaic virus | TSWV – Tomato spotted wilt virus | TYLCV – Tomato yellow leaf curl virus

Tomate Híb.

# Runner



Tomate híbrido produtivo, de planta vigorosa, com frutos graúdos e uniformes de ótima qualidade. Apresenta resistência elevada à Fol O,1, Va, Vd e intermediária à N (Ma, Mi, Mj), ToMV, TSWV, Ff (A-E), On.



Destaque

Híbrido produtivo com frutos graúdos de ótima qualidade.



Frutos

Tipo salada, uniformes, firmes, brilhantes e de excelente classificação, com peso médio de 220 a 250 gramas.



Planta

Planta vigorosa, de hábito de crescimento indeterminado, internódios curtos e alta produtividade. Cultivar precoce de ciclo entre 100 a 110 dias.




Resistência

Fol O,1; Va; Vd; N (Ma, Mi, Mj); ToMV; TSWV; Ff (A-E) e On.

Fol O,1 – *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* raças 1 e 2 | Va – *Verticillium albo-atrum* | Vd – *Verticillium dahliae*  
N (Ma, Mi, Mj) – *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javani* | Ff (A-E) – *Fulvia fulva* (*Passarola fulvia*) raças A e E  
ToMV – *Tomato mosaic virus* | TSWV – *Tomato spotted wilt virus* | On – *Oidium neolycopersici*

Tomate Híb.

# Cordel



Tomate de plantas vigorosas, alta produtividade, frutos grandes, de excelente firmeza e sanidade. Possui resistência elevada à Fol O,1, Va, Vd, e resistência intermediária à TMV, TSWV e TYLCV.



Destaque

Alta produtividade e frutos firmes.



Frutos

Frutos do tipo saladete, grandes, uniformes e muito firmes.



Planta

Plantas vigorosas com boa sanidade, excelente pegamento de frutos, cobertura foliar e hábito de crescimento determinado. Ciclo entre 100 a 110 dias.




Resistência

Fol O,1; Va; Vd; TMV; TSWV e TYLCV.

Fol O,1 – *Fusarium oxysporum* f.sp. *lycopersici* raças 1 e 2 | Va – *Verticillium albo-atrum* | Vd – *Verticillium dahliae*  
TMV – *Tobacco mosaic virus* | TSWV – *Tomato spotted wilt virus* | TYLCV – *Tomato yellow leaf curl virus*

Tomate Híb.

# Vitalino



Tomate tipo saladete, hábito determinado, alta produtividade, com frutos grandes e de excelente firmeza. Possui resistência elevada à Fol O,1, Va, Vd e resistência intermediária à N (Ma, Mi, Mj), TMV, TSWV e TYLCV.



Destaque

Frutos graúdos e alta produtividade.



Frutos

Frutos do tipo saladete, graúdos, uniformes, de excelente firmeza e com ótimo pós-colheita.



Planta

Plantas vigorosas com alta produtividade, excelente cobertura foliar e hábito de crescimento determinado.  
Ciclo entre 100 a 110 dias.



Resistência

Fol O,1; Va; Vd; N; TMV; TSWV e TYLCV.

Fol O,1 – *Fusarium oxysporum* f.sp. *lycopersici* raças 1 e 2 | Va – *Verticillium albo-atrum* | Vd – *Verticillium dahliae*  
N (Ma,Mi,Mj) – *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*  
TMV – Tobacco mosaic virus | TSWV – Tomato spotted wilt virus | TYLCV – Tomato yellow leaf curl virus

Uma linha completa  
com tudo o que você precisa.





Abóbora Canhão Seca

## Gigante

Rusticidade e uniformidade



Abóbora

## Goianinha


Alta produtividade e uniformidade de frutos



Abóbora Híb.

## Tetsukabuto Divina

Fácil cultivo e excelente resistência pós-colheita



Abobrinha Híb.

## Atlanta

Uniformidade e precocidade



Agrião D'Água

## Folha Larga

Folhas médias e talos mais finos



Agrião Gigante da

## Serra Calixto

Folhas graúdas e alta produtividade



Abóbora

## Jacarezinho

Rusticidade e uniformidade de frutos



Abóbora

## Mini Paulista

Frutos menores e excelente aspecto comercial



Abóbora

## Moranga Exposição

Qualidade de sementes e frutos pesados



Alface

## Green Frizzly


Crocância e sabor



Alface

## Lia

Uniformidade e tolerância ao pendoamento precoce



Alface

## Marisa


Plantas grandes e altamente tolerantes ao calor



Abóbora Sergipana

## Tipo Maranhão


Excelente padrão de mercado e conservação pós-colheita



Abobrinha

## Caserta

Uniformidade e qualidade de frutos



Abobrinha

## Menina Brasileira

Excelente padrão de mercado e resistência ao vírus do mosaico da melancia



Alho-porro

## Gigante NT

Alto rendimento e padrão comercial



Almeirão

## Catalonha

Qualidade de sementes



Almeirão

## Folha Larga

Qualidade de sementes e uniformidade

# SEMENTES QUE VALORIZAM A VIDA



Almeirão

**Spadona**

Qualidade de sementes



Aneto

**Dill**


Indicado para uso culinário e medicinal



Beterraba Early

**Wonder Tall Top**


Sementes com boa germinação e alta qualidade



Cebola Roxa

**Red Creole C5**

Escamas de coloração vermelha escura e formato globular achatado



Cebola Texas Early

**Grano 502 PRR**

Excelente padrão comercial



Cebolinha

**Todo Ano**

Uniformidade com bom desenvolvimento vegetativo



Brócolis

**Piracicaba**


Excelente aspecto comercial e qualidade de sementes



Brócolis Ramoso

**Santana**


Alto valor comercial



Cebola Bola

**Suprema**


Casca firme e excelente pós-colheita



Cenoura

**Brasília**

Qualidade de sementes



Cenoura

**Nantes**


De alta qualidade e tolerante ao pendoamento precoce



Chicória Escarola

**Lisa Gigante**


Qualidade de sementes



Cebola

**Crioula**


Uniformidade e qualidade de bulbos



Cebola

**Ipa 10 (roxa)**

Rusticidade



Cebola

**Ipa 11**

Qualidade de sementes



Coentro Americano

**Gigante**

Alta produtividade



Couve-chinesa

**Mizuna**

Precocidade e resistência a doenças



Couve-de-folha Manteiga


**Georgia**

Rusticidade e folhas grandes

SEMENTES QUE VALORIZAM A VIDA



Ervilha Reta de  
**Flor Roxa**  
Qualidade e produtividade




Feijão-vagem Macarrão  
**Rasteiro**  
Uniformidade de plantas e vagens




Funcho Erva-Doce Híb.  
**Tauro**  
Resistente ao pendoamento precoce



Maxixe do  
**Norte**  
Uniformidade




Melancia  
**Fairfax**  
Resistência à doenças e fruto de polpa macia




Melancia  
**Pérola**  
Planta vigorosa, produtiva com ótima qualidade de polpa



Gobô  
**Shirohada**  
Qualidade de raízes




Jiló Comprido  
**Verde Claro**  
Qualidade de sementes




Jiló Morro  
**Redondo**  
Produtividade e uniformidade de frutos



Mostarda  
**Lisa**  
Qualidade de sementes



Pepino Híb. Caipira  
**Guarani**  
Alta produtividade e excelente qualidade de frutos



Pepino Híb.  
**Yuri**  
Rusticidade



Manjerição  
**Genovese**  
Folhas grandes e uniformes



Manjerição  
**Grecco a Palla**  
Planta em formato compacto



Maracujá Redondo  
**Amarelo**  
Frutos graúdos de coloração amarelo intenso



Repolho  
**Roxo NT**  
Qualidade de sementes



Rúcula  
**Folha Larga**  
Folhas grandes e muito produtivas



Rúcula  
**Selvática**  
Sabor diferenciado



Salsa  
**Lisa**

Qualidade de sementes  
e muito aromáticas



Salsa Graúda  
**Portuguesa**

Qualidade de sementes  
e tamanho de folíolos



## Dicas de Plantio

| Espécie/cultivar           | Semeadura e Plantio | Espaçamento (m) |                  | Nº estimado       | Nº aprox.  | uso sementes/ha |
|----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|
|                            |                     | Fileiras        | Plantas ou covas | plantas (1000)/ha | sementes/g |                 |
| Abób. Nova Caravela/Canhão | Direto              | 2,00–3,00       | 2,00             | 1.7/2.5           | 11         | 400–600 g       |
| Abóbora Goianinha          | Direto              | 2,00–3,00       | 2,00             | 2.5               | 20         | 200–300 g       |
| Abóbora Jacarezinho        | Direto              | 2,00–3,00       | 2,00             | 2.5               | 11         | 400–600 g       |
| Abóbora Menina Brasileira  | Direto              | 2,00–2,50       | 1,00–1,50        | 2.5               | 11         | 300 g           |
| Abóbora Menina Clara       | Direto              | 2,00–2,50       | 1,00             | 2.5               | 11         | 1,0–1 kg        |
| Abóbora Tetsukabuto        | Direto              | 2,00–3,00       | 2,00             | 2.5               | 5          | 0,9–13 kg       |
| Abobrinha                  | Direto              | 1,00–1,20       | 0,50–0,80        | 14.0–20.0         | 5–7        | 3,0–5,0 kg      |
| Agrião D'água              | Sementeira          | 0,2             | 0,20             | 250               | 5100       | 15–2,0 kg       |
| Alface                     | Sementeira/Direto   | 0,20–0,30       | 0,20–0,30        | 89.0/200.0        | 950        | 190–430 g       |
| Almeirão                   | Direto              | 0,15–0,20       | 0,05             | 800.0/1067.0      | 680        | 24–32 kg        |
| Bardano                    | Direto              | 0,5             | 0,20–0,30        | 66.7/100.0        | 85         | 10–6,0 kg       |
| Berinjela                  | Sementeira          | 1,20–1,50       | 0,50–0,60        | 11.1/16.6         | 230        | 100–150 g       |
| Beterraba                  | Sementeira/Direto   | 0,3             | 0,08–0,10        | 320.0/400.0       | 67         | 70–9,0 kg       |
| Brócolis                   | Sementeira          | 1,00            | 0,50             | 20                | 260        | 160 g           |
| Cebola                     | Sementeira/Direto   | 0,25–0,30       | 0,25–0,30        | 267.0/320.0       | 310        | 1,8–2,1 kg      |
| Couve-de-bruxelas          | Sementeira          | 1,00            | 0,50             | 20                | 400        | 100 g           |
| Cebolinha de Folha         | Sementeira          | 0,20–0,25       | 0,20–0,25        | 160.0/200.0       | 450        | 730–900 g       |
| Cenoura                    | Direto              | 0,15–0,20       | 0,04–0,05        | 800.0/1330.0      | 720        | 40–6,0 kg       |
| Chicória                   | Sementeira          | 0,3             | 0,25             | 128               | 750        | 350 g           |
| Coentro                    | Direto              | 0,20–0,30       | 0,10             | 267.0/400.0       | 78         | 5,0–7,0 kg      |
| Couve-chinesa              | Sementeira          | 0,8             | 0,30             | 42                | 340        | 250 g           |
| Couve-de-folha             | Sementeira          | 1,0             | 0,40–0,50        | 20.0/25.0         | 270        | 150–190 g       |
| Couve-flor                 | Sementeira          | 1,0             | 0,50–0,60        | 17.0/20.0         | 380        | 90–110 g        |
| Ervilha de Vagem           | Direto              | 1,0             | 0,40–0,50        | 20.0/25.0         | 4          | 130–160 kg      |
| Espinafre Verdadeiro       | Direto              | 0,20–0,30       | 0,05             | 533.0/800.0       | 98         | 8,0–12,0 kg     |
| Feijão-vagem Rasteiro      | Direto              | 0,40–0,50       | 0,10             | 200.0/250.0       | 4          | 700–900 kg      |
| Feijão-vagem Trepador      | Direto              | 1,00            | 0,50             | 20                | 4          | 13,0 kg         |
| Jiló                       | Sementeira          | 1,00–1,50       | 0,50–0,70        | 9.5/20.0          | 530        | 40–80 g         |
| Melancia                   | Direto              | 2,00–3,00       | 1.50–2,00        | 2.5/3.3           | 11         | 600–800 g       |
| Melão                      | Direto              | 2,0             | 1,00–1,50        | 3.3/5.0           | 26         | 300–500 g       |
| Milho Verde                | Direto              | 1,0             | 0,20             | 50                | 7          | 100 kg          |
| Mogango                    | Direto              | 2,0             | 2,00             | 2.5               | 8          | 800 g           |
| Moranga                    | Direto              | 2.00–3,00       | 2,00             | 1.7/2.5           | 6          | 0,7–1,0 kg      |
| Mostarda                   | Direto              | 0,3             | 0,20             | 133               | 680        | 15–20 kg        |
| Nabo                       | Direto              | 0,30–0,35       | 0,10–0,15        | 152.0/267.0       | 580        | 20–25 kg        |
| Pepino                     | Direto              | 1,00–1,20       | 0,50–0,60        | 11.0/20.0         | 40         | 0,7–1,3 kg      |
| Pimenta                    | Sementeira          | 1,2             | 0,60–0,80        | 10.4/13.9         | 320        | 70–90 g         |
| Pimentão                   | Sementeira          | 1,00            | 0,30–0,40        | 25.0/33.3         | 170        | 300–400 g       |
| Quiabo                     | Direto              | 1,0             | 0,20–0,30        | 33.0/50.0         | 17         | 6,0–9,0 kg      |
| Rábano                     | Direto              | 0,4             | 0,20             | 125.0             | 80         | 25 kg           |
| Rabanete                   | Direto              | 0,2             | 0,04–0,05        | 800.0/1000.0      | 110        | 10,0–130 kg     |
| Repolho                    | Sementeira          | 0,80–1,00       | 0,30–0,40        | 25.0/42.0         | 280        | 180–300 g       |
| Rúcula                     | Direto              | 0,20–0,30       | 0,05             | 533.0/800.0       | 650        | 12–18 kg        |
| Salsa                      | Direto              | 0,20–0,31       | 0,10–0,15        | 178.0/400.0       | 550        | 4,0–45 g        |
| Tomate                     | Sementeira          | 0,80–1,20       | 0,40–0,80        | 16.6/31.0         | 340        | 100–190 g       |

fonte: Manual Técnico para Cultivo de Hortaliças – ABCSEM – 2020



ABRIL 2025



Hortíceres Sementes Ltda  
Av. Presidente Vargas, 2921 - SI 1210  
Sky Towers Office | Indaiatuba - SP  
CEP 13338-705 | Brasil

 hortíceres<sup>®</sup>  
sementes