



SEMENTES QUE VALORIZAM A VIDA

CATÁLOGO DE PRODUTOS

20 26



Histórias que cultivam o futuro.

Histórias que começam com a escolha da semente certa e se desenvolvem ao longo do tempo, com técnica, dedicação e resiliência.

Histórias de produtores que transformam desafios em resultado. De agrônomos que conectam conhecimento à prática. De famílias que constroem seu futuro a partir da terra.

Nossas sementes são desenvolvidas com foco em alta performance e são resultado de pesquisa, tecnologia e validação prática no dia a dia.

Cultivamos inovação, fortalecendo relações e gerando resultados consistentes que se transformam em histórias reais de sucesso no campo desde 1967.

Horticeres. Performance que se planta. Resultado que se conta.

 **horticeres**
sementes
SEMENTES QUE VALORIZAM A VIDA

Índice

5	Abobrinha Híb. Aurora	40	Couve-flor Híb. Vick
6	Abóbora Híb. Kanda	41	Couve-de-folha Híb. HS 20
7	Agrião Ônix	42	Couve-manteiga Híb. HS 30
8	Alface Ariel	43	Espinafre Nova Zelândia
9	Alface Cris	44	Feijão-vagem Brutus
10	Alface Manu	45	Feijão-vagem Gisele
11	Alface Liz	46	Feijão-vagem Grazi
12	Alface Alice	47	Pepino Híb. Kataná
13	Alface Betty	48	Pepino Híb. Odissey
14	Alface Gabi	49	Pepino Híb. HS 1020
15	Alface Florence	50	Pepino Híb. Ouro Verde
16	Alface Rosanna	51	Melancia Híb. Vitta
17	Alho-porro Atal	52	Melão Híb. Canarinho
18	Almeirão Pão de Açúcar	53	Melão Híb. Estrela
19	Berinjela Híb. Roxelle	54	Pimenta Mexicali
20	Beterraba Híb. Cabernet	55	Pimentão Híb. Heloísa
21	Cebola Híb. Poliana	56	Pimentão Híb. Isabela
22	Cebola Híb. Raiza	57	Pimentão Híb. Isadora
23	Brócolis Híb. Akemi	58	Porta-enxerto Focus
24	Cebolinha Híb. Nagoya	59	Rabanete Híb. HS 2030
25	Cebolinha Folha Ibirité	60	Salsa da Roça
26	Cebolinha Midoriakawa	61	Quiabo Híb. Majestade
27	Cebolinha Sappore	62	Quiabo Speedy
28	Cebolinha Tokyo Kuro	63	Repolho Híb. Murasaki
29	Cenoura Sertão	64	Repolho Híb. Soberano
30	Cenoura Híb. Andressa	65	Rúcula Selecta
31	Chicória Amazonas Gigante	66	Rúcula Thunder
32	Chicória Malan	67	Tomate Híb. Red Sugar
33	Chicória Melissa	68	Tomate Híb. Dante
34	Chicória Radicchio Di Fiorentino	69	Tomate Híb. Vero
35	Coentro Aruba	70	Tomate Híb. F3ra
36	Coentro Verdão	71	Tomate Híb. Runner
37	Couve-chinesa Híb. Eikoo	72	Tomate Híb. Cordel
38	Couve-chinesa Híb. Hodan	73	Tomate Híb. Vitalino
39	Couve-flor Híb. Fuji	74	Demais produtos

Abobrinha Híb.

Aurora



Abobrinha híbrida, do tipo italiana, com plantas vigorosas e frutos com excelente coloração, brilho e pós-colheita.



Alta produção com elevada resistência a viroses.

Destaque



Frutos do segmento caserta (italiana), de formato cilíndrico, com excelente coloração, brilho e pós-colheita.

Fruto



Planta vigorosa, com presença de mosqueado nas folhas e hábito de crescimento em moita. Ciclo entre 40 a 50 dias.

Planta



Ano todo com destaque no verão.

Época de plantio

Abóbora Híb.

Kanda



Abóbora híbrida japonesa (tipo Tetsukabuto) de planta vigorosa, frutos uniformes, polpa espessa e de alta produtividade. Apresenta excelente pós-colheita.

Produtividade e uniformidade.

Destaque

Frutos de formato globular, levemente gomados, uniformes, coloração verde escura, brilhante, polpa espessa apresentando peso médio de 2,2 a 2,8 kg.

Fruto

Plantas vigorosas, uniformes, com hábito de crescimento rasteiro e excelente emissão de brotos laterais. Ciclo entre 85 a 110 dias.

Planta

Ano todo em regiões de clima quente e em épocas quentes para regiões de clima ameno.

Época de plantio

Agrião

Ônix



Agrião de planta uniforme, raízes vigorosas e tolerante ao pendoamento precoce. Mercado hidropônico.

Alta produtividade e bom rendimento de maço.

Destaque

Folhas largas e eretas, de formato arredondado, com pecíolo longo e coloração verde-intenso.

Folhas


Planta vigorosa, uniforme e de alta produtividade. Ciclo entre 50 a 55 dias.

Planta

Ano todo.

Época de plantio

Alface Ariel



Alface tipo crespa de plantas grandes, uniformes e de excelente padrão comercial. Apresenta alta tolerância ao pendoamento. Indicada para o cultivo protegido, campo aberto e hidropônico. Resistência à LMV (*Lettuce mosaic virus*).

Plantas grandes e excelente aspecto comercial.



Destaque

Folhas largas, simétricas e de coloração verde-intenso e brilhantes.



Folhas

Plantas grandes, uniformes e alto volume de folhas. Ciclo entre 60 a 65 dias.



Planta

Ano todo com destaque no verão.



Época de plantio

Alface Cris



Alface do tipo crespa de plantas grandes, com folhas largas e simétricas de excelente aspecto comercial. Apresenta resistência ao pendoamento, *tip burn* e às 25 principais raças de Míldio* que ocorrem no Brasil.

Resistência ao Míldio e aspecto comercial.



Destaque

Folhas largas, simétricas, com alta crespicidade e coloração verde-intenso.



Folhas

Plantas grandes e volumosas, apresentando estabilidade e excelente aspecto comercial. Ciclo entre 60 a 65 dias.



Planta

25 principais raças de Míldio (BI)* que ocorrem no Brasil.



Resistência

*BI - *Bremia lactucae*

Alface

Manu



Alface tipo crespa de plantas grandes, formato ereto e alto número de folhas na planta, uniformes e de excelente padrão comercial. Apresenta folhas repicadas e alta tolerância ao pendoamento. Indicada para o cultivo protegido, campo aberto e hidropônico.

Planta elevado número de folhas aliado a boa segurança.

Folhas largas, repicadas, de coloração verde-intenso e brilhantes

Plantas grandes, eretas, uniformes e alto volume de folhas. Ciclo entre 55 e 60 dias.

Ano todo.

Alface

Liz



Alface tipo lisa de plantas grandes, uniformes, com folhas brilhantes. Excelente padrão comercial e boa sanidade. Resistência à LMV (*Lettuce mosaic virus*).

Plantas grandes e sem fechamento de cabeça.

Folhas lisas, coloração verde-claro, brilhante. Sem fechamento de cabeça.

Plantas grandes e uniformes. Excelente padrão comercial e resistentes ao pendoamento precoce. Ciclo entre 55 a 60 dias.

Ano todo.

Alface **Alice**



Alface do tipo americana, de plantas grandes, uniformes, folhas largas e grossas. Produz alfaces de cabeças graúdas e compactas, com excelente coloração e brilho.

Plantas grandes e uniformes.



Destaque

Folhas largas e grossas que conferem boa proteção à cabeça.



Folhas

Plantas grandes, uniformes, com alto volume de folhas e boa tolerância a doenças foliares. Ciclo entre 80 a 90 dias.



Planta

Primavera e verão.



Época de plantio

Alface **Betty**



Alface do tipo americana, de plantas grandes e uniformes, folhas largas e grossas. Apresenta excelente desempenho para cultivos em épocas e regiões de temperaturas elevadas, com destaque para a resistência de campo.

Cultivo em altas temperaturas e uniformidade.



Destaque

Largas e grossas, conferindo boa proteção à cabeça. Excelente coloração e brilho.



Folhas

Plantas grandes, uniformes, com alto volume de folhas, tolerantes ao pendoamento precoce. Ciclo entre 80 a 90 dias.



Planta

Cultivo de verão.



Época de plantio

Alface

Gabi



Alface do tipo mimosa, de plantas grandes, simétricas e uniformes com alta resistência ao pendoamento precoce, *tip burn*, LMV e às principais raças de Míldio que ocorrem no Brasil.

★

Tamanho e resistência ao pendoamento precoce.

★

Destaque

🌿

Folhas tipo mimosa, grandes e de coloração verde-claro.

🌿

Folhas

🌱

Plantas grandes e simétricas, uniformes e com alto volume de folhas. Ciclo entre 50 a 60 dias.

🌱

Planta

🛡️

Míldio (BI) e LMV.

🛡️

Resistência

BI – *Bremia lactucae* | LMV – *Lettuce mosaic virus*

Alface

Florence



Alface do tipo mimosa de plantas volumosas, tolerantes ao pendoamento precoce e de excelente aspecto comercial.

★

Plantas volumosas.

★

Destaque

🌿

Folhas tipo mimosa com coloração verde-médio brilhante e repicadas.

🌿

Folhas

🌱

Plantas vigorosas, volumosas, tolerantes ao pendoamento precoce e excelente aspecto comercial. Ciclo entre 50 a 60 dias.

🌱

Planta

🌞

Ano todo com destaque no verão.

🌞

Época de plantio

Alface

Rosanna



Alface tipo crespa de plantas grandes e volumosas, com folhas de coloração roxo intenso. Tolerante ao pendoamento precoce.

Tamanho e coloração.

Destaque

Folhas grandes, crespas e de coloração roxo intenso brilhante.

Folhas

Plantas grandes, volumosas, com boa formação de base. Tolerante ao pendoamento precoce. Ciclo entre 50 a 60 dias.

Planta

Ano todo.

Época de plantio

Alho-porro

Atal



Alho-porro de planta com formação ereta, talos longos, grossos, boa durabilidade pós-colheita e alto rendimento. Referência de mercado.

Alto rendimento e padrão comercial.

Destaque

Talos de coloração branca, longos, grossos, com média de 20 a 25 cm de comprimento. Boa durabilidade pós-colheita e excelente rendimento.

Talo

Planta de formação ereta, com folhas de coloração verde-claro. Ciclo entre 110 a 140 dias.

Planta

Ano todo.

Época de cultivo

Almeirão

Pão de Açúcar



Seleção de plantas vigorosas de elevada uniformidade visando a formação de mais de 90% de cabeças. Sementes produzidas especialmente para peletização. Praticidade na semeadura, aliada a alta taxa de germinação e vigor.

Cabeça de qualidade e uniformidade.



Destaque

Folhas grandes e de coloração verde-médio brilhante.



Folhas

Planta vigorosa, volumosa, uniforme com ótimo fechamento de cabeça. Excelente aspecto comercial. Ciclo entre 60 a 70 dias.



Planta

Ano todo para clima ameno e outono/ inverno para regiões de clima quente.



Época de plantio

Berinjela Híb.

Roxelle



Berinjela híbrida de planta vigorosa, com alta produtividade e frutos de excelente padrão comercial. Apresenta resistência elevada à Cg.

Qualidade de frutos.



Destaque

Frutos de formato padrão, com comprimento médio de 20 - 22 cm e peso médio de 250 a 270 g, coloração intensa, brilhante e excelente aspecto comercial.



Frutos

Planta vigorosa, com boa arquitetura, fácil condução, bom pegamento de frutos e alta produtividade. Ciclo médio de 110 dias.



Planta

Resistência intermediária à Cg.



Resistência

Cg – *Colletotrichum gloeosporioides*

Beterraba Híb.

Cabernet



Beterraba híbrida de plantas vigorosas, uniformes, raiz arredondada de alta produtividade e resistência a doenças.

 **Destaque** Alta produtividade e resistência a doenças.

 **Raiz** Raiz de formato arredondado, com coloração interna e externa vermelho-intenso. Pequena inserção de folhas e sem presença de halos esbranquiçados.


 **Planta** Plantas vigorosas, uniformes, folhas eretas, comprimento entre 30 e 35 cm. Ciclo entre 70 a 80 dias.

 **Resistência** Pfb, Cb e Eb.

Pfb – *Peronospora farinosa* f. sp. *betae* | Cb – *Cercospora beticola* | Eb – *Erysiphe betae* (oídio)

Cebola Híb.

Poliana



Híbrido de dia curto, com planta vigorosa, bulbos arredondados, de coloração amarelo-claro e elevado potencial produtivo. Apresenta resistência à Pt.

 **Destaque** Qualidade e produtividade.

 **Bulbo** Bulbos arredondados de coloração amarelo-claro com “pescoço” fino.

 **Planta** Planta vigorosa, porte ereto, alto potencial produtivo. Ciclo entre 110 a 130 dias.

 **Resistência** Pt.

Pt – *Pyrenochaeta terrestris*

Cebola Híb.

Raiza



Híbrido de dia curto, com planta vigorosa e folhagem verde-escuro com boa cerosidade. Produz bulbos arredondados e uniformes de coloração amarela, com alta produtividade e resistência à raiz rosada (*Pyrenochaeta terrestris*).



Alta produtividade e excelente sistema radicular.

Destaque



Bulbos arredondados, uniformes e de coloração amarela.

Bulbo



Planta com folhagem vigorosa, boa cerosidade e coloração verde-escuro. Ciclo entre 125 e 130 dias.

Planta

Pt.



Resistência

Pt – *Pyrenochaeta terrestris*

Brócolis Híb.

Akemi



Brócolis híbrido do tipo ramoso, de plantas vigorosas, com alta brotação lateral, granulometria média e excelente pós-colheita.



Qualidade de maços e produtividade.

Destaque



Cabeças uniformes, com floretes longos de granulometria média, excelente pós-colheita e qualidade de maços.

Cabeça



Plantas vigorosas, uniformes e alta brotação. Ciclo entre 90 a 110 dias.

Planta



Indicado para cultivo em temperaturas amenas e frias.

Época de cultivo

Cebolinha Híb.

Nagoya



Cebolinha híbrida de planta vigorosa, com folhas de coloração verde-escuro. Apresenta facilidade de toalete.

☆

Destaque

Alto vigor e coloração intensa.

🌿

Folhas

Folhas de coloração verde-escuro com baixa incidência de queima de pontas e quebra de folhas.

🌱

Planta

Planta vigorosa, com boa sanidade e facilidade de toalete. Ciclo entre 60 a 70 dias.

🌞

Época de cultivo

Ano todo.

Cebolinha

Folha Ibirité



Cebolinha de planta vigorosa, uniforme, porte ereto e alta capacidade de perfilhamento. Apresenta resistência à Pt (Raiz Rosada).

☆

Destaque

Qualidade de maços.

🌿

Folhas

Folhas eretas, de coloração verde-claro e secção transversal arredondada.

🌱

Planta

Planta vigorosa e uniforme, com boa capacidade de perfilhamento e boa conservação pós-colheita. Ciclo entre 80 a 90 dias.

🛡️

Resistência

Raiz Rosada (Pt).

Pt – *Pyrenochaeta terrestris*

Cebolinha

Midoriakawa



Cebolinha fina de plantas vigorosas, com alto perfilhamento, folhas de parede espessa, excelente resistência a doenças foliares e sanidade. Apresenta ótima pós-colheita e aspecto comercial.



Alta sanidade e resistência a doenças foliares.

Destaque



Folhas de coloração verde escura brilhante, parede espessa e boa resistência a doenças foliares. Pouca ocorrência de folhas amarelas, reduzindo o tempo de preparo dos maços.

Folhas



Plantas vigorosas, porte ereto e bom perfilhamento. Apresenta boa resistência à quebra das folhas e alta performance sob condições de elevada amplitude térmica. Ciclo entre 60 a 80 dias.

Planta




Ano todo.

Época de cultivo

Cebolinha

Sappore



Cebolinha de planta vigorosa, com alta sanidade, folhas finas e muito produtivas. Apresenta boa tolerância a doenças foliares.



Alta produtividade e ótimo pós-colheita.

Destaque



Folhas finas, de coloração verde azulada. Permite até 5 cortes sem engrossar as folhas.

Folhas



Plantas vigorosas, produtivas e de ótimo pós-colheita. Ciclo entre 60 a 80 dias.

Planta



Ano todo.

Época de cultivo

Cebolinha

Tokyo Kuro



Cebolinha de planta vigorosa, porte ereto, bom perfilhamento, com folhas de parede espessa e alto rendimento. Possui elevada performance sob condições de alta amplitude térmica.

Alta performance.

Destaque

Folhas de coloração verde escura brilhante, boa resistência a doenças foliares, parede espessa e com boa conservação pós-colheita, obtendo altos rendimentos de maços.

Folhas

Planta muito vigorosa, porte ereto, bom perfilhamento, podendo ser colhida como folhas finas ou médias. Ciclo entre 70 a 90 dias.

Planta

Ano todo.

Época de cultivo

Cenoura

Sertão



Cenoura de plantas rústicas, raízes lisas, cilíndricas e ponta arredondada. Adaptação em temperaturas quentes e amenas. Apresenta resistência elevada à Ad, Cc e intermediária à N (Mi, Ma, Mj), Xhc.

Cultivo de verão e resistência a doenças.

Destaque

Raízes lisas, de coloração alaranjado intenso, formato cilíndrico, comprimento médio entre 18 e 22 cm, diâmetro médio entre 3 cm e 3,5 cm e ponta arredondada.

Raízes

Plantas rústicas, com folhagem vigorosa, porte médio de 25 - 30 cm. Tolerante ao pendoamento precoce. Ciclo entre 85 a 100 dias.

Planta


Ad, Cc, N e Xhc.

Resistência

Ad – *Alternaria dauci* | Cc – *Cercospora carotae* | Xhc – *Xanthomonas hortorum* pv. *carotae*
N (Ma, Mi, Mj) – *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*

Cenoura Híb.

Andressa



Híbrido de verão, precoce, com raízes de excelente produtividade, coloração, pele e brilho. Apresenta resistência elevada à Ad, Cc e intermediária à Xhc.

 Destaque

Elevada produtividade e precocidade.

 Raízes

Raízes de formato cilíndrico com excelente comprimento, coloração (alaranjado intenso), pele e brilho. Coração pequeno, ponta arredondada e ótimo fechamento de ombro e ponta.

 Planta

Planta vigorosa, ereta e com bom enfolhamento. Ciclo entre 90 a 100 dias.

 Resistência

Ad, Cc e Xhc.

Ad – *Alternaria dauci* | Cc – *Cercospora carotae* | Xhc – *Xanthomonas hortorum* pv. *carotae*

Chicória

Amazonas Gigante



Chicória de plantas grandes e vigorosas, folhas uniformes, largas e excelente aspecto comercial.

 Destaque

Plantas grandes e rusticidade.

 Folhas

Folhas grandes, uniformes, largas e de coloração verde-médio.

 Planta

Plantas vigorosas e uniformes com folhas basais grandes e largas. Ciclo entre 70 a 90 dias.

 Época de cultivo

Ano todo com destaque no verão.

Chicória

Malan



Chicória de plantas grandes, uniformes, com folhas grossas e crocantes. Tolerantes ao pendoamento precoce e excelente aspecto comercial.

Uniformidade e coração cheio.



Destaque

Folhas grossas, crocantes, coloração verde-brilhante.



Folhas

Plantas grandes, uniformes, rústicas e com coração bem cheio. Apresenta tolerância ao pendoamento e excelente aspecto comercial. Ciclo entre 70 a 90 dias.



Planta

Ano todo.



Época de cultivo

Chicória

Melissa



Chicória do tipo lisa, de plantas vigorosas, pesadas, folhas grandes, sem recortes e ondulações. Possui boa sanidade e excelente padrão comercial.

Resistente ao pendoamento precoce.



Destaque

Folhas grandes, de coloração verde-médio, sem recortes e sem ondulações.



Folhas

Plantas vigorosas, rústicas, pesadas, com bom enchimento, boa formação de base e estabilidade. Ciclo entre 70 a 90 dias.



Planta

Ano todo.



Época de cultivo

Radicchio

Di Fiorentino



Chicória Radiccio de plantas com boa formação, uniformidade, cabeças graúdas e tolerantes ao pendoamento precoce. Indicadas para épocas de clima ameno.



Destaque

Cabeças graúdas e uniformes.



Cabeça

Cabeça compacta, graúda, de formato arredondado, coloração vermelho-intenso brilhante e nervuras brancas.



Planta

Planta uniforme, com boa formação de base, compacidade e tolerância ao pendoamento precoce.



Época de cultivo

Indicadas para temperaturas e épocas amenas.

Coentro

Aruba



Coentro de planta vigorosa, uniforme e volumosa, com folhas largas, talos grossos e excelente padrão comercial. Em hidroponia, apresenta poucas quantidades de folhas amareladas, reduzindo a necessidade de toalete. Apresenta bom enraizamento e tolerância ao pendoamento.



Destaque

Excelente sanidade e qualidade de maços.



Folhas

Folhas largas, grandes, lisas, de coloração verde-escuro brilhante.



Planta

Plantas muito vigorosas, uniformes, com excelente volume de maços e talos grossos. Tolerantes ao pendoamento. Ciclo de 50 a 60 dias.



Época de cultivo

Ano todo com destaque em temperaturas quentes, evitar épocas e regiões muito frias.

Coentro

Verdão



Coentro de plantas vigorosas, rústicas, de folhas lisas e aromáticas. Sementes revestidas por *filmcoating*, garantindo eficiência e proteção do agricultor e meio ambiente.



Destaque

Qualidade e tratamento de sementes (*filmcoating*).



Folhas

Folhas lisas, de coloração verde-escuro brilhante e muito aromáticas.



Planta

Plantas vigorosas, uniformes, rústicas e altamente produtivas. Ciclo entre 40 a 50 dias.



Época de cultivo

Melhor adaptação em temperaturas quentes com excelente adaptação às regiões Norte e Nordeste.

Couve-chinesa Híb.

Eikoo



Couve chinesa de planta vigorosa, uniforme, cabeça compacta, excelente sanidade foliar. Apresenta resistência elevada à Pb.



Destaque

Excelente qualidade de cabeças.



Cabeça

Cabeças compactas, de coloração externa verde-escura e interna amarela-brilhante.



Planta

Plantas vigorosas, uniformes, com alta sanidade. Ciclo médio de 80 dias.



Resistência

Pb.

Pb – *Plasmodiophora brassicae*

Couve-chinesa Híb.

Hodan



Couve de planta vigorosa, com folhas eretas, cabeça compacta, excelente sanidade foliar e destaque para o cultivo em altas temperaturas. Apresenta resistência elevada à Pb e Abe e intermediária à TuMV e CaMV.



Excelente sanidade e qualidade de plantas.

Destaque



Cabeças compactas, de formato bala de canhão e miolo amarelado.

Cabeça



Planta vigorosa, com folhas eretas, alta sanidade e ciclo médio de 80 dias.

Planta



Pb, Abe, TuMV e CaMV.

Resistência

Resistência elevada: Pb - *Plasmiodiophora brassicae* | Abe - *Alternaria brassicae*
Resistência intermediária: TuMV - *Turnip mosaic virus* | CaMV - *Cauliflower mosaic virus*

Couve-flor Híb.

Fuji



Couve-flor híbrida de plantas muito vigorosas, uniformes e produtivas. Apresenta boa sanidade foliar, tolerância às variações climáticas e excelente durabilidade pós-colheita.



Sanidade e estabilidade.

Destaque



Cabeças grandes e compactas, de coloração branca, com excelente aspecto comercial e durabilidade pós-colheita.

Cabeça



Plantas vigorosas, uniformes, produtivas, com folhas grandes, apresentando boa sanidade foliar e tolerância às variações climáticas. Ciclo entre 100 a 105 dias.

Planta



Cultivo de inverno.

Época de cultivo

Couve-flor Híb.

Vick



Couve-flor híbrida de planta vigorosa, uniforme, cabeças de excelente aspecto comercial. Indicada para cultivos de verão. Apresenta resistência intermediária à Xcc.



Destaque

Alta produtividade e estabilidade.



Cabeça

Cabeça grande, compacta, uniforme, coloração branca, com excelente qualidade e aspecto comercial.



Planta

Plantas vigorosas e uniformes com folhas grandes que proporcionam excelente proteção de cabeças. Ciclo de 90 a 100 dias.



Resistência

Xcc.

Xcc – *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*

Couve-de-folha Híb.

HS 20



Couve híbrida de alta produtividade e uniformidade de folhas. Excelente performance de campo.



Destaque

Alta produtividade e uniformidade de folhas.



Folhas

Folhas grandes e redondas, de coloração verde-médio, bordos lisos e nervuras pouco salientes.



Planta

Plantas uniformes, compactas, internódios curtos e tolerantes a diversas condições de solo e clima. Pouca brotação lateral e altura média de 60 a 110 cm. Ciclo entre 70 a 80 dias.



Época de cultivo

Ano todo.

Couve-manteiga Híb.

HS 30



Couve-manteiga híbrida de alta produtividade, rendimento e uniformidade de folhas do início ao final do ciclo.



Alto rendimento e padronização de folhas.

Destaque



Folhas grandes, levemente onduladas de coloração verde-médio, pecíolo preenchido e nervuras finas.

Folhas



Plantas de tamanho uniforme, internódios curtos, média brotação lateral, altura média de planta de 60 a 110 cm. Ciclo médio de 65 a 75 dias.

Planta



Ano todo.

Época de cultivo

Espinafre

Nova Zelândia



Espinafre com boa adaptação a diversas condições de solo e clima, folhas grandes e alto potencial produtivo.



Elevada taxa de germinação e alto vigor.

Destaque



Folhas grandes e de coloração verde-escura.

Folhas



Plantas vigorosas com alto potencial produtivo e boa adaptação a diversas condições climáticas. Ciclo entre 60 a 90 dias.

Planta



Ano todo.

Época de cultivo

Feijão-vagem

Brutus



Feijão-vagem de crescimento determinado, com vagens cilíndricas de alta produtividade. Apresenta resistência elevada à CI e intermediária à BCMV, Psp raça 6.



Destaque

Alta produtividade e estabilidade.



Vagem

Vagens cilíndricas, lisas e retas, de coloração verde-escura brilhante.



Planta

Plantas vigorosas com hábito de crescimento determinado, porte ereto, evitando o contato das vagens com o solo. Ciclo entre 60 a 70 dias.



Resistência

CI, BCMV e Psp.

CI - Colletotrichum lindemuthianum | BCMV - Bean common mosaic virus
Psp - Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola raça 6

Feijão-vagem

Gisele



Feijão-vagem de crescimento indeterminado, vagens com produção sequencial, boa sanidade e longevidade de colheita. Excelente sabor e ausência de fibras. Apresenta resistência intermediária à BCMV.



Destaque

Vagem com excelente qualidade e coloração verde-intenso.



Vagem

Vagens de excelente qualidade, boa sanidade, formato cilíndrico (comprimento médio de 15 cm) e coloração verde-escuro.



Planta

Plantas vigorosas, com hábito de crescimento indeterminado, bom pegamento de flor, produção sequencial e muito produtiva. Ciclo entre 80 a 90 dias.



Resistência

BCMV.

BCMV - Bean common mosaic virus

Feijão-vagem

Grazi



Feijão-vagem de crescimento indeterminado, com vagens retas, uniformes e lisas. Apresenta excelente padrão de mercado e resistência elevada a CI, Ua e intermediária BCMV.

Destaque

Produtividade e resistência a doenças.

Vagem

Vagens retas, uniformes, formato cilíndrico, coloração verde-claro e com pouca fibra. Apresenta excelente qualidade e padrão de mercado.

Planta

Plantas vigorosas, com hábito de crescimento indeterminado, muito produtivas e bem enfolhadas. Ciclo entre 80 a 90 dias.

Resistência

CI, Ua e BCMV.

CI - Colletotrichum lindemuthianum | Ua - Uromyces appendiculatus | BCMV - Bean common mosaic virus

Pepino Híb.

Kataná



Pepino híbrido tipo japonês, de frutos retos, uniformes e com alta produtividade. Apresenta resistência à Ccu, Co, Pcu, Px e intermediária à CMV, WMV, ZYMV.

Destaque

Alta produtividade e resistência a doenças.

Fruto

Frutos tipo japonês, retos, uniformes e de coloração verde-escuro brilhante. Apresenta espinhos brancos, formato cilíndrico e comprimento médio entre 22 e 25 cm.

Planta

Planta vigorosa com brotação lateral, monóico, com carga bem distribuída no ciclo e colheita estendida. Ciclo entre 50 a 60 dias.

Resistência

Ccu, Co, Pcu, Px, CMV, WMV e ZYMV.

Ccu - Cladosporium cucumerinum | Co - Colletotrichum orbiculare | Px - Podosphaera xanthii | Pcu - Pseudoperonospora cubensis
CMV - Cucumber mosaic virus | WMV - Watermelon mosaic virus | ZYMV - Zucchini yellow mosaic virus

Pepino Híb.

Odissey



Pepino híbrido do tipo caipira, de planta vigorosa, uniforme, com excelente sanidade e padrão comercial. Indicado para consumo fresco ou conserva. Apresenta resistência elevada à Co, Px e intermediária à Ccu, CMV, PRSV, ZYMV, WM.

Alto pegamento, rendimento e padronização de frutos.

Destaque

Frutos tipo caipira, uniformes, de coloração verde-escuro, com excelente padrão comercial.

Fruto

Plantas vigorosas, monoicas, com excelente sanidade e alto pegamento sequencial de frutos. Ciclo médio de 50 dias.

Planta

Co, Px, Ccu, CMV, PRSV, ZYMV, WMV.

Resistência

Co – Colletotrichum orbiculare | Px – Podosphaera xanthii | Ccu – Cladosporium cucumerium | CMV – Cucumber mosaic virus | PRSV – Papaya ringspot virus | ZYMV – Zucchini yellow mosaic virus | WMV – Watermelon mosaic virus

Pepino Híb.

HS 1020



Pepino híbrido de hábito indeterminado, planta vigorosa, frutos de coloração verde-escuro (aodai), retos, produtivos e excelente padrão. Apresenta resistência elevada à Px, Co, Ccu e intermediária à CMV, ZYMV, PRSV, Psl, Pcu, Cca.

Produtividade e excelente padrão comercial.

Destaque

Frutos de coloração verde-escuro (aodai), brilhantes, retos, de casca lisa com espinhos pouco salientes. Apresenta comprimento médio entre 20 - 25 cm e diâmetro médio entre 6 - 7 cm.

Fruto

Plantas de crescimento indeterminado, ginoicas, vigorosas, com alta brotação lateral e pegamento sequencial de frutos. Ciclo entre 40 a 60 dias.

Planta

Ccu, Co, Px, Cca, CMV, Pcu, PRSV, Psl, ZYMV.

Resistência

Ccu – Cladosporium cucumerinum | Co – Colletotrichum orbiculare | Px – Podosphaera xanthii | Cca – Corynespora cassicola | CMV – Cucumber mosaic virus | Pcu – Pseudoperonospora cubensis | PRSV – Papaya ringspot virus | Psl – Pseudomonas syringae pv. lachrymans | ZYMV – Zucchini yellow mosaic virus

Pepino Híb.

Ouro Verde



Pepino híbrido de hábito indeterminado, planta vigorosa, frutos de coloração verde-escuro (aodai), retos, produtivos, excelente padrão e sanidade. Apresenta resistência elevada à WMV, ZYMV, PRSV e intermediária à CMV, Ccu e PX.



Destaque

Sanidade, rusticidade e excelente padrão comercial.



Fruto

Frutos de coloração verde-escuro (aodai), brilhantes, retos, uniformes, de casca lisa com espinhos pouco salientes. Apresenta comprimento médio entre 18 a 23 cm.



Planta

Plantas de crescimento indeterminado, ginoicas, vigorosas, com alto pegamento sequencial de frutos. Ciclo entre 50-60 dias.



Resistência

WMV, ZYMV, PRSV, CMV, Ccu e PX

WMV – Watermelon Mosaic Virus | ZYMV – Zucchini yellow mosaic virus | PRSV – Papaya ringspot virus | CMV – Cucumber mosaic virus
Ccu – Cladosporium cucumerinum | Px – Podosphaera xanthii

Melancia Híb.

Vitta



Planta vigorosa com boa cobertura de frutos do tipo Crimson, de casca verde com estrias e excelente qualidade interna. Peso médio de 14 a 15 kg e ciclo de 80 dias.



Destaque

Frutos graúdos com excelente pós-colheita.



Fruto

Frutos graúdos do tipo Crimson, de casca verde com estrias e excelente qualidade interna com parede espessa. Peso médio de 14 a 15 kg.



Planta

Planta vigorosa com boa cobertura, folhas repicadas e com excelente pegamento de frutos. Ciclo médio de 80 a 90 dias.



Época de cultivo

Verão.

Melão Híb.

Canarinho



Planta vigorosa e produtiva com frutos grandes pesando de 3 a 4 kg, casca de cor amarela-intensa, forma elíptica, excelente sabor, alto brix e polpa firme.

Produtividade e padrão de mercado.



Destaque

Grandes, com média de 3 a 4 kg, cor da casca amarela-intensa, polpa firme, alto brix e excelente sabor.



Fruto

Vigorosa, tolerante a doenças e alta frutificação (média de 1,5 frutos por planta).



Planta

Maio a novembro.



Época de cultivo

Melão Híb.

Estrela



Melão de plantas rústicas, com hábito de crescimento rasteiro, frutos de coloração alaranjada com sulcos longitudinais, polpa crocante e excelente sabor.

Sanidade de planta e excelente sabor.



Destaque

Fruto de coloração amarelo-ouro, com bom calibre, pós-colheita e excelente brix. Peso de 1,8 a 2,4 kg.



Fruto

Planta vigorosa, com boa adaptação e com excelente cobertura foliar. Ciclo de 68 a 72 dias.



Planta

Primavera e verão.



Época de cultivo

Pimenta

Mexicali



Pimenta de planta vigorosa, uniforme com frutos grandes, de polpa espessa e média pungência.

Alta produtividade e excelente qualidade de frutos.

Destaque

Frutos grandes, uniformes, de tamanho médio entre 10 e 12 cm, diâmetro médio entre 2 e 2,5 cm, com coloração vermelho-brilhante, polpa espessa e pungência média.

Frutos

Plantas vigorosas, rústicas e uniformes. Ciclo entre 110 a 130 dias.

Planta

Primavera e verão.

Época de cultivo

Pimentão Híb.

Heloísa



Pimentão híbrido de plantas vigorosas, uniformes, com pegamento sequencial de frutos e alto potencial produtivo. Ótimo padrão comercial.

Alta produtividade e ótimo padrão comercial.

Destaque

Frutos do tipo lamuyo, coloração verde-escuro, casca lisa, parede espessa, de peso entre 250 - 300 g e comprimento médio entre 16 - 18 cm. Apresentam ótimo padrão comercial.

Frutos

Plantas vigorosas, uniformes e muito produtivas. Porte médio, com alto enfolhamento e folhas verde-escuro. Ciclo entre 100 a 110 dias.

Planta

PVY 1,2 e ToMV.

Resistência

PVY 1,2 – Potato Y virus | ToMV – Tomato mosaic virus

Pimentão Híb.

Isabela



Pimentão de plantas vigorosas, porte alto, frutos de formato cônico, casca lisa e polpa espessa. Apresenta resistência elevada à Pc e Pp, e intermediária à PVY e ToMV.

Resistência à *Phytophthora*.



Destaque

Frutos de formato cônico, casca lisa, polpa espessa, peso entre 200 e 220 g, comprimento médio de 14 a 16 cm, diâmetro de 6 a 8 cm e coloração verde-intenso.



Frutos

Planta vigorosa, uniforme, de porte alto e bem enfolhada.
Ciclo entre 100 a 110 dias.



Planta

Pc, Pp, PVY e ToMV.



Resistência

Pc – *Phytophthora capsici* | Pp – *Phytophthora porri* | PVY – *Potato Y virus* raças 1 e 2 | ToMV – *Tomato mosaic virus*

Pimentão Híb.

Isadora



Pimentão híbrido de plantas vigorosas, uniformes, com pegamento sequencial de frutos, alto potencial produtivo e segurança, devido suas resistências. Ótimo padrão comercial, de coloração verde-escuro. Ciclo de 100 a 110 dias.

Alta produtividade e sanidade.



Destaque

Frutos do tipo lamuyo, coloração verde-escuro, casca lisa, parede espessa, peso entre 250 - 300 g e comprimento médio entre 16 - 18 cm. Apresentam ótimo padrão comercial.



Frutos

Plantas vigorosas, uniformes, resistentes e muito produtivas. Porte médio/alto, com alto enfolhamento e folhas verde-escuro. Ciclo entre 100 e 110 dias.



Planta

PVY 1, 2, ToMV e Xcv 0, 1, 2, 3, 7 e 8.



Resistência

PVY 1, 2 – *Potato Y virus* | ToMV – *Tomato mosaic virus* | Xcv – *Xanthomonas yellow mosaic virus*

Porta-enxerto
Focus



Planta de vigor intermediário, com alta resistência à Ralstonia, proporciona maior vigor radicular e melhor compatibilidade de enxertia e segurança aos principais patógenos de solo.

Resistência a Ralstonia e sanidade de solo.



Destaque

Proporciona maior aumento do sistema radicular com resistência aos principais patógenos de solo. Possibilidade de morte de plantas sob condições ambientais favoráveis e/ou alta pressão do patógeno.



Raízes

Porta-enxerto intraespecífico, com excelente compatibilidade com os híbridos do mercado de planta e vigor vegetativo intermediário.



Planta

Fol, Mi, Mj, ToMV, Vd e Rs.



Resistência

Fol – *Fusarium oxysporum* f. sp. | Mi – *Meloidogyne incognita* | Mj – *Meloidogyne javanica* | ToMV – *Tomato mosaic vírus*
Vd – *Verticillium dahliae* | Rs – *Ralstonia solanacearum*

Rabanete Híb.

HS 2030



Rabanete híbrido, de planta vigorosa, muito uniformes e tolerantes à rachadura e isoporização.

Raízes uniformes e tolerantes à rachadura e isoporização.



Destaque

Raízes de formato arredondado, excelente uniformidade e coloração vermelha-intensa.



Raízes

Planta de porte médio, com boa quantidade de folhas, ideal para comercialização em maços. Ciclo entre 25 a 35 dias.



Planta

Ano todo.



Época de cultivo

Salsa

da Roça



Salsa do tipo lisa de planta vigorosa, uniforme, produtiva, folíolos grandes e com ótima sanidade. Excelente desenvolvimento no verão.

Sanidade e alta produtividade.



Destaque

Folhas de coloração verde-escuro brilhante, folíolos grandes e recortados, pecíolo com comprimento médio de 10 cm, apresentando baixa incidência de folhas pequenas na base (reduz descarte).



Folhas

Plantas do tipo lisa, muito vigorosas, uniformes e com ótima brotação. Alto volume de raízes. Ciclo entre 55 a 75 dias.



Planta

Ano todo, com destaque para verão. Atenção para semeaduras entre março a junho, pois há risco de pendoamento.



Época de cultivo

Quiabo Híb.

Majestade



Planta de crescimento indeterminado, vigorosa, com boa brotação lateral, excelente sanidade foliar, alta produtividade e precocidade.

Produtividade e precocidade.



Destaque

Frutos verde-claros, de formato cilíndrico, sem espinhos e boa durabilidade pós-colheita. Peso médio de 8 a 10 g.



Frutos

Planta de crescimento indeterminado, vigorosa, produtiva, com excelente brotação lateral e sanidade. Ciclo entre 60 a 80 dias.



Planta

Primavera e verão.



Época de cultivo

Quiabo

Speedy



Quiabo de planta vigorosa, com menor presença de espinhos e frutos uniformes. Apresenta maior facilidade de colheita e precocidade.

Precocidade e qualidade de frutos.

Destaque

Frutos uniformes, de coloração verde-médio brilhante, crocantes e ausência de fibras. Apresentam comprimento médio entre 10 - 20 cm.

Frutos

Plantas vigorosas, uniformes, de porte baixo, com internódios curtos. Folhas verde-escuro digitadas, sem presença de espinhos. Ciclo entre 45 a 55 dias.

Planta

Indicados para épocas e regiões de temperaturas quentes.

Época de cultivo

Repolho Híb.

Murasaki



Repolho híbrido de planta vigorosa, formato redondo e levemente achatado, excelente coloração e alta uniformidade. Apresenta resistência intermediária à Xcc.

Alta tolerância a doenças foliares.

Destaque

Cabeça arredondada e levemente achatada, de coloração roxa-intensa e miolo compacto.

Cabeça

Planta vigorosa, com boa cobertura foliar.

Planta

Xcc.

Resistência

Xcc – *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*

Repolho Híb.

Soberano



Repolho híbrido verde de planta vigorosa, cabeça grande, compacta e uniforme. Apresenta resistência elevada à Foc e intermediária à Xcc.



Destaque

Uniformidade e sanidade.



Cabeça

Grande, compacta, pesada e de formato semi-achatado. Apresenta coração pequeno.



Planta

Planta vigorosa, com boa cobertura foliar e alta sanidade. Folhas de coloração verde-escuras e cerosas. Ciclo entre 90 a 100 dias.



Resistência

Foc e Xcc.

Foc – *Fusarium oxysporum* f. sp. *conglutinans* | Xcc – *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*

Rúcula

Selecta



Rúcula de planta vigorosa, uniforme, com folhas largas, compridas e levemente recortadas. Ideal para o cultivo hidropônico, em estufas e campo.



Destaque

Folhas grandes e alta produtividade.



Folhas

Folhas largas, levemente recortadas, de coloração verde-escuro, comprimento médio entre 22 – 25 cm e largura 6 – 7 cm.



Planta

Plantas vigorosas, uniformes, de alta produtividade que resultam em maços de excelente aspecto comercial. Ciclo entre 40 a 45 dias.



Época de cultivo

Ano todo.

Rúcula

Thunder



Rúcula de planta vigorosa, uniforme, com folhas largas, compridas e levemente recortadas. Ideal para o cultivo hidropônico e convencional.

Precocidade e sanidade.



Destaque

Folhas largas, compridas, levemente recortadas, de coloração verde-escuro.



Folhas

Plantas vigorosas, uniformes, com alta produtividade e maços de excelente aspecto comercial.



Ciclo entre 30 a 40 dias.

Planta

Ano todo.



Época de cultivo

Tomate Híb.

Red Sugar



Tomate híbrido tipo grape de hábito de crescimento indeterminado, planta vigorosa, com boa sanidade, frutos de formato grape, com polpa espessa e excelente aspecto comercial. Apresenta resistência elevada à Fol O,1, Va, Vd e intermediária à N (Mi), ToMV.

Alta produtividade e uniformidade.



Destaque

Frutos de formato grape, simétricos, com excelente aspecto comercial, peso médio de 20 - 25 g, polpa espessa e coloração vermelho-intenso brilhante.



Frutos

Planta vigorosa, com hábito de crescimento indeterminado, boa proteção foliar e boa sanidade. Ciclo entre 100 a 120 dias.



Planta

Fol O,1 (raças 1 e 2), Va, Vd, N (Mi) e ToMVd.



Resistência

Fol O,1 – *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* raças 1 e 2 | Va – *Verticillium albo-altrum* | Vd – *Verticillium dahliae*
N (Mi) – *Meloidogyne incognita* | ToMV – *Tomato mosaic virus*

Tomate Híb.

Dante



Tomate de plantas vigorosas, frutos graúdos, excelente firmeza, com ótima qualidade e sabor. Possui resistência elevada à Va, Vd, Fol O,1, Ss e resistência intermediária à N (Ma, Mi, Mj), TMV, TSWV e TYLCV.

Ótima qualidade de frutos e excelente pacote de resistência a doenças.

Destaque

Frutos graúdos, uniformes, firmes, de formato saladete, com ótima qualidade, coloração, brilho e sabor.

Frutos

Plantas vigorosas com excelente cobertura foliar, de hábito de crescimento indeterminado. Ciclo entre 100 a 110 dias.

Planta

Va, Vd, Fol O,1, N, Ss, N (Ma, Mi, Mj), TMV, TSWV e TYLCV.

Resistência

Va - Verticillium albo-atrum | Vd - Verticillium dahliae | Fol O,1 - Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici raças 1 e 2
Ss - Stemphylium solani | N (Ma, Mi, Mj) - Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica
TMV - Tobacco mosaic virus | TSWV - Tomato spotted wilt virus | TYLCV - Tomato yellow leaf curl virus

Tomate Híb.

Vero



Tomate de plantas vigorosas, com alta produtividade, frutos alongados, firmes e excelente sabor. Apresenta resistência elevada à Fol O,1 e O,2, Va, ToMV e intermediária à N (Mi), TSWV, TYLCV.

Sabor e qualidade de frutos.

Destaque

Frutos do tipo italiano, formato alongado, firmes, coloração vermelho-intenso e excelente sabor.

Frutos

Plantas vigorosas, com alta produtividade e hábito de crescimento indeterminado. Ciclo entre 90 a 110 dias.

Planta

Fol O,1 e O,2, Va, ToMV, N (Mi), TSWV e TYLCV.

Resistência

Fol O,1 e O,2 - Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici raças 1, 2, 3 | Va - Verticillium albo-atrum | ToMV - Tomato mosaic virus
N (Mi) - Meloidogyne incognita | TSWV - Tomato spotted wilt virus | TYLCV - Tomato yellow leaf curl virus

Tomate Híb.

F3ra



Tomate tipo salada, de hábito indeterminado, com plantas vigorosas, que apresentam boa sanidade de folhas nas chuvas e frutos grandes, de excelente firmeza e tolerância a rachaduras nas chuvas. Possui resistência elevada à Va, Vd, Fol 0,2 e resistência intermediária à N (Ma, Mi, Mj), TMV, TSWV, TYLCV.



Destaque

Resistência a *Fusarium* raça 3 e sanidade na chuva.



Frutos

Frutos do tipo salada, grandes, uniformes, excelente firmeza e tolerantes a rachaduras no período chuvoso.



Planta

Plantas vigorosas e equilibradas, com boa cobertura foliar, sanidade e hábito de crescimento indeterminado. Ciclo entre 100 a 110 dias.



Resistência

Va, Vd, Fol 0,2, N, TMV, TSWV e TYLCV.

Va - *Verticillium albo-altrum* | Vd - *Verticillium dahliae* | Fol 0,2 - *Fusarium oxysporum* f.sp. *lycopersici* raça 3
N (Ma,Mi,Mj) - *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*
TMV - Tobacco mosaic virus | TSWV - Tomato spotted wilt virus | TYLCV - Tomato yellow leaf curl virus

Tomate Híb.

Runner



Tomate híbrido produtivo, de planta vigorosa, com frutos graúdos e uniformes de ótima qualidade. Apresenta resistência elevada à Fol 0,1, Va, Vd e intermediária à N (Ma, Mi, Mj), ToMV, TSWV, Ff (A-E), On.



Destaque

Híbrido produtivo com frutos graúdos de ótima qualidade.



Frutos

Tipo salada, uniformes, firmes, brilhantes e de excelente classificação, com peso médio de 220 a 250 gramas.



Planta

Planta vigorosa, de hábito de crescimento indeterminado, internódios curtos e alta produtividade. Cultivar precoce de ciclo entre 100 a 110 dias.



Resistência

Fol 0,1, Va, Vd, N (Ma, Mi, Mj), ToMV, TSWV, Ff (A-E) e On.

Fol 0,1 - *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* raças 1 e 2 | Va - *Verticillium albo-altrum* | Vd - *Verticillium dahliae*
N (Ma, Mi, Mj) - *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javani* | Ff (A-E) - *Fulvia fulva* (*Passarola fulvia*) raças A e E
ToMV - Tomato mosaic virus | TSWV - Tomato spotted wilt virus | On - *Oidium neolycopersici*

Tomate Híb.

Cordel



Tomate de plantas vigorosas, alta produtividade, frutos grandes, de excelente firmeza e sanidade. Possui resistência elevada à Fol O,1, Va, Vd, e resistência intermediária à TMV, TSWV e TYLCV.



Destaque

Alta produtividade e frutos firmes.



Frutos

Frutos do tipo saladete, grandes, uniformes e muito firmes.



Planta

Plantas vigorosas com boa sanidade, excelente pegamento de frutos, cobertura foliar e hábito de crescimento determinado.
Ciclo entre 100 a 110 dias.



Resistência

Fol O,1, Va, Vd, TMV, TSWV e TYLCV.

Fol O,1 – *Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici* raças 1 e 2 | Va – *Verticillium albo-atrum* | Vd – *Verticillium dahliae*
TMV – Tobacco mosaic virus | TSWV – Tomato spotted wilt virus | TYLCV – Tomato yellow leaf curl virus

Tomate Híb.

Vitalino



Tomate tipo saladete, hábito determinado, alta produtividade, com frutos grandes e de excelente firmeza. Possui resistência elevada à Fol O,1, Va, Vd e resistência intermediária à N (Ma, Mi, Mj), TMV, TSWV e TYLCV.



Destaque

Frutos graúdos e alta produtividade.



Frutos

Frutos do tipo saladete, graúdos, uniformes, de excelente firmeza e com ótimo pós-colheita.



Planta

Plantas vigorosas com alta produtividade, excelente cobertura foliar e hábito de crescimento determinado.
Ciclo entre 100 a 110 dias.



Resistência

Fol O,1, Va, Vd, N, TMV, TSWV e TYLCV.

Fol O,1 – *Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici* raças 1 e 2 | Va – *Verticillium albo-atrum* | Vd – *Verticillium dahliae*
N (Ma,Mi,Mj) – *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*
TMV – Tobacco mosaic virus | TSWV – Tomato spotted wilt virus | TYLCV – Tomato yellow leaf curl virus





Abóbora Canhão Seca

Gigante

Rusticidade e uniformidade



Abóbora

Goianinha


Alta produtividade e uniformidade de frutos



Abóbora Híb.

Tetsukabuto Divina

Fácil cultivo e excelente resistência pós-colheita



Abobrinha Híb.

Atlanta

Uniformidade e precocidade



Agrião D'Água

Folha Larga

Folhas médias e talos mais finos



Agrião Gigante da

Serra Calixto

Folhas graúdas e alta produtividade



Abóbora

Jacarezinho

Rusticidade e uniformidade de frutos



Abóbora

Mini Paulista

Frutos menores e excelente aspecto comercial



Abóbora

Moranga Exposição

Qualidade de sementes e frutos pesados



Alface

Green Frizzly

Crocância e sabor



Alface

Lia

Uniformidade e tolerância ao pendoamento precoce



Alface

Marisa


Plantas grandes e altamente tolerantes ao calor



Abóbora Sergipana

Tipo Maranhão


Excelente padrão de mercado e conservação pós-colheita



Abobrinha

Caserta

Uniformidade e qualidade de frutos



Abobrinha

Menina Brasileira

Excelente padrão de mercado e resistência ao vírus do mosaico da melancia



Alho-porro

Gigante NT

Alto rendimento e padrão comercial



Almeirão

Catalonha

Qualidade de sementes



Almeirão

Folha Larga

Qualidade de sementes e uniformidade



SEMENTES QUE VALORIZAM A VIDA





Almeirão

Spadona

Qualidade de sementes



Aneto

Dill


Indicado para uso culinário e medicinal



Beterraba Early

Wonder Tall Top


Sementes com boa germinação e alta qualidade



Cebola Roxa

Red Creole C5

Escamas de coloração vermelha escura e formato globular achatado



Cebola Texas Early

Grano 502 PRR

Excelente padrão comercial



Cebolinha

Todo Ano

Uniformidade com bom desenvolvimento vegetativo



Brócolis

Piracicaba


Excelente aspecto comercial e qualidade de sementes



Brócolis Ramoso

Santana


Alto valor comercial



Cebola Bola

Suprema


Casca firme e excelente pós-colheita



Cenoura

Brasília

Qualidade de sementes



Cenoura

Nantes


De alta qualidade e tolerante ao pendoamento precoce



Chicória Escarola

Lisa Gigante


Qualidade de sementes



Cebola

Crioula


Uniformidade e qualidade de bulbos



Cebola

Ipa 10 (roxa)

Rusticidade



Cebola

Ipa 11

Qualidade de sementes



Coentro Americano

Gigante

Alta produtividade



Couve-chinesa

Mizuna

Precocidade e resistência a doenças



Couve-de-folha Manteiga

Georgia


Rusticidade e folhas grandes



Ervilha Reta de

Flor Roxa

Qualidade e produtividade



Feijão-vagem Macarrão

Rasteiro


Uniformidade de plantas e vagens



Funcho Erva-Doce Híb.

Tauro


Resistente ao pendoamento precoce



Maxixe do

Norte


Uniformidade



Melancia

Fairfax

Resistência à doenças e fruto de polpa macia



Melancia

Pérola


Planta vigorosa, produtiva com ótima qualidade de polpa



Gobô

Shirohada


Qualidade de raízes



Jiló Comprido

Verde-claro

Qualidade de sementes



Jiló Morro

Redondo


Produtividade e uniformidade de frutos



Mostarda

Lisa


Qualidade de sementes



Pepino Híb. Caipira

Guarani

Alta produtividade e excelente qualidade de frutos



Pepino Híb.

Yuri

Rusticidade



Manjeriço

Genovese

Folhas grandes e uniformes



Manjeriço

Grecco a Palla

Planta em formato compacto



Maracujá Redondo

Amarelo

Frutos graúdos de coloração amarelo intenso



Repolho

Roxo NT

Qualidade de sementes



Rúcula

Folha Larga

Folhas grandes e muito produtivas



Rúcula

Selvática

Sabor diferenciado



Salsa
Lisa
Qualidade de sementes
e muito aromáticas



Salsa Graúda
Portuguesa
Qualidade de sementes
e tamanho de folíolos



SEMENTES QUE VALORIZAM A VIDA

Dicas de Plantio

Espécie/cultivar	Semeadura e Plantio	Espaçamento (m)		Nº estimado	Nº aprox.	uso sementes/ha
		Fileiras	Plantas ou covas	plantas (1000)/ha	sementes/g	
Abób. Nova Caravela/Canhão	Direto	2,00–3,00	2,00	1.7/2.5	11	400–600 g
Abóbora Goianinha	Direto	2,00–3,00	2,00	2.5	20	200–300 g
Abóbora Jacarezinho	Direto	2,00–3,00	2,00	2.5	11	400–600 g
Abóbora Menina Brasileira	Direto	2,00–2,50	1,00–1,50	2.5	11	300 g
Abóbora Menina Clara	Direto	2,00–2,50	1,00	2.5	11	1,0–1 kg
Abóbora Tetsukabuto	Direto	2,00–3,00	2,00	2.5	5	0,9–13 kg
Abobrinha	Direto	1,00–1,20	0,50–0,80	14.0–20.0	5–7	3,0–5,0 kg
Agrião D’água	Sementeira	0,2	0,20	250	5100	15–2,0 kg
Alface	Sementeira/Direto	0,20–0,30	0,20–0,30	89.0/200.0	950	190–430 g
Almeirão	Direto	0,15–0,20	0,05	800.0/1067.0	680	24–32 kg
Bardano	Direto	0,5	0,20–0,30	66.7/100.0	85	10–6,0 kg
Berinjela	Sementeira	1,20–1,50	0,50–0,60	11.1/16.6	230	100–150 g
Beterraba	Sementeira/Direto	0,3	0,08–0,10	320.0/400.0	67	70–9,0 kg
Brócolis	Sementeira	1,00	0,50	20	260	160 g
Cebola	Sementeira/Direto	0,25–0,30	0,25–0,30	267.0/320.0	310	1,8–2,1 kg
Couve-de-bruxelas	Sementeira	1,00	0,50	20	400	100 g
Cebolinha de Folha	Sementeira	0,20–0,25	0,20–0,25	160.0/200.0	450	730–900 g
Cenoura	Direto	0,15–0,20	0,04–0,05	800.0/1330.0	720	40–6,0 kg
Chicória	Sementeira	0,3	0,25	128	750	350 g
Coentro	Direto	0,20–0,30	0,10	267.0/400.0	78	5,0–7,0 kg
Couve-chinesa	Sementeira	0,8	0,30	42	340	250 g
Couve-de-folha	Sementeira	1,0	0,40–0,50	20.0/25.0	270	150–190 g
Couve-flor	Sementeira	1,0	0,50–0,60	17.0/20.0	380	90–110 g
Ervilha de Vagem	Direto	1,0	0,40–0,50	20.0/25.0	4	130–160 kg
Espinafre Verdadeiro	Direto	0,20–0,30	0,05	533.0/800.0	98	8,0–12,0 kg
Feijão-vagem Rasteiro	Direto	0,40–0,50	0,10	200.0/250.0	4	700–900 kg
Feijão-vagem Trepador	Direto	1,00	0,50	20	4	13,0 kg
Jiló	Sementeira	1,00–1,50	0,50–0,70	9.5/20.0	530	40–80 g
Melancia	Direto	2,00–3,00	1,50–2,00	2.5/3.3	11	600–800 g
Melão	Direto	2,0	1,00–1,50	3.3/5.0	26	300–500 g
Milho Verde	Direto	1,0	0,20	50	7	100 kg
Mogango	Direto	2,0	2,00	2.5	8	800 g
Moranga	Direto	2.00–3.00	2,00	1.7/2.5	6	0,7–1,0 kg
Mostarda	Direto	0,3	0,20	133	680	15–20 kg
Nabo	Direto	0,30–0,35	0,10–0,15	152.0/267.0	580	20–25 kg
Pepino	Direto	1,00–1,20	0,50–0,60	11.0/20.0	40	0,7–1,3 kg
Pimenta	Sementeira	1,2	0,60–0,80	10.4/13.9	320	70–90 g
Pimentão	Sementeira	1,00	0,30–0,40	25.0/33.3	170	300–400 g
Quiabo	Direto	1,0	0,20–0,30	33.0/50.0	17	6,0–9,0 kg
Rábano	Direto	0,4	0,20	125.0	80	25 kg
Rabanete	Direto	0,2	0,04–0,05	800.0/1000.0	110	10,0–130 kg
Repolho	Sementeira	0,80–1,00	0,30–0,40	25.0/42.0	280	180–300 g
Rúcula	Direto	0,20–0,30	0,05	533.0/800.0	650	12–18 kg
Salsa	Direto	0,20–0,31	0,10–0,15	178.0/400.0	550	4,0–45 g
Tomate	Sementeira	0,80–1,20	0,40–0,80	16.6/31.0	340	100–190 g

fonte: Manual Técnico para Cultivo de Hortaliças – ABCSEM – 2020

Uma linha
completa
com tudo
o que você
precisa.

imagens ilustrativas



ABRIL 2026



SEMENTES QUE VALORIZAM A VIDA



Hortieres Sementes Ltda
Av. Presidente Vargas, 2921 - SI 1210
Sky Towers Office | Indaiatuba - SP
CEP 13338-705 | Brasil